

मूत्राशय Botox (मूत्राशय नियंत्रण के लिए)

रोगी जानकारी • अति सक्रिय मूत्राशय को शांत करने के इंजेक्शन

WARWIKI

मूत्राशय Botox अति सक्रिय मूत्राशय (OAB) के लिए एक उपचार है — पेशाब की अचानक तीव्र इच्छा, बार-बार पेशाब, और इच्छा के साथ रिसाव — जब जीवनशैली बदलाव और दवाओं से पर्याप्त सुधार न हो। एक छोटे scope के ज़रिए मूत्राशय की मांसपेशी में बोटुलिनिम toxin की सूक्ष्म मात्रा इंजेक्ट की जाती है। असर 1–2 हफ्तों में दिखता है और आमतौर पर लगभग 6 महीने रहता है।

यह कैसे काम करती है

अति सक्रिय मूत्राशय की मांसपेशी बिना ज़रूरत के सिकुड़ती है। Botox उस मांसपेशी को **शिथिल करता है**, जिससे अनियंत्रित संकुचन बंद होता है — पेशाब की तीव्र इच्छा, बार-बार पेशाब और रिसाव कम होता है। असर तुरंत नहीं होता; **1–2 हफ्तों** में सुधार महसूस होगा।

क्या यह सुरक्षित है?

हाँ, यह एक स्थापित उपचार है। सबसे ज़रूरी बात: मांसपेशी शिथिल होने से कभी-कभी मूत्राशय **पूरी तरह खाली करना मुश्किल** हो सकता है — कुछ लोगों को असर खत्म होने तक अस्थायी रूप से **स्व-कैथेटराइज़ेशन** करनी पड़ती है। इसलिए आपको ज़रूरत पड़ने पर यह सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। अन्य दुष्प्रभावों में मूत्र मार्ग संक्रमण (UTI) और थोड़े समय के लिए पेशाब में खून शामिल हैं।

शब्दों को समझें

अति सक्रिय मूत्राशय

मूत्राशय के समय से पहले सिकुड़ने से पेशाब की तीव्र इच्छा और बार-बार पेशाब।

बोटुलिनिम toxin (Botox)

एक दवा जो इंजेक्ट करने पर मांसपेशी को शिथिल करती है।

Detrusor

मूत्राशय की वह मांसपेशी जिसमें इंजेक्शन दिया जाता है।

Cystoscope

इंजेक्शन देने के लिए उपयोग किया जाने वाला पतला camera।

स्व-कैथेटराइज़ेशन

मूत्राशय खाली करने के लिए पतली नली डालना, जो कभी-कभी अस्थायी रूप से ज़रूरी होती है।

Post-void residual

पेशाब के बाद बचा मूत्र — प्रक्रिया के बाद जाँचा जाता है।

क्या इसमें दर्द होगा? पहले मूत्राशय में सुन्न करने वाली दवा डाली जाती है, इसलिए अधिकांश लोगों को इंजेक्शन के दौरान केवल हल्का दबाव महसूस होता है। यह आमतौर पर **लोकल एनेस्थीसिया में office में होने वाली प्रक्रिया** है, जिसमें लगभग 10–15 मिनट लगते हैं, और आप तुरंत घर जा सकते हैं।

तैयारी कैसे करें

- संक्रमण जाँचने के लिए पहले **urine test**।
- प्रक्रिया के आसपास **antibiotic** दी जा सकती है।
- अपनी टीम को **blood thinners** के बारे में बताएँ और ज़रूरत पड़ने पर स्व-कैथेटराइज़ेशन सीखने के लिए तैयार रहें।

क्या होता है

- 1 मूत्राशय में सुन्न करने वाला तरल डाला जाता है।
- 2 मूत्रमार्ग से पतला **cystoscope** डाला जाता है।
- 3 मूत्राशय की दीवार में कई छोटे स्थानों पर Botox इंजेक्ट किया जाता है।
- 4 scope निकाला जाता है — पूरी प्रक्रिया लगभग 10–15 मिनट की होती है।

बाद में

- एक-दो दिन हल्की जलन या पेशाब में थोड़ा खून सामान्य है।
- 1–2 हफ्तों में सुधार होता है; असर लगभग 6 महीने रहता है और **दोबारा** लिया जा सकता है।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- **पेशाब न आए** या मूत्राशय पूरा न खाली हो
- बुखार या ठंड लगना (संक्रमण हो सकता है)
- पेशाब में अधिक खून या थक्के
- कुछ दिनों बाद जलन बढ़ जाए

जानने योग्य

- प्रक्रिया के बाद आमतौर पर मूत्राशय के खाली होने की **जाँच** की जाती है।
- दोबारा खुराक लेनी हो तो कई महीनों का अंतर रखा जाता है।

याद रखने योग्य तीन बातें

1. मूत्राशय Botox अति सक्रिय मूत्राशय की मांसपेशी को शिथिल करता है, जिससे तीव्र इच्छा, बार-बार पेशाब और रिसाव कम होता है; असर 1–2 हफ्तों में आता है और ~6 महीने रहता है।
2. यह एक त्वरित office प्रक्रिया है; मुख्य बात यह है कि कुछ लोगों को अस्थायी स्व-कैथेटराइज़ेशन की ज़रूरत पड़ सकती है।
3. प्रक्रिया के बाद पेशाब न आए या बुखार हो तो तुरंत अपनी टीम को बुलाएँ।