

Colpocleisis (योनि बंद करने की सर्जरी)

WARWIKI

रोगी जानकारी · प्रोलैप्स के लिए एक सरल, टिकाऊ सर्जरी जो योनि को बंद करती है

Colpocleisis पेल्विक अंग प्रोलैप्स के लिए एक बेहद प्रभावी और शरीर पर कम भार डालने वाली सर्जरी है, जो योनि नलिका के अधिकांश भाग को बंद करके अंगों को स्थायी रूप से ऊपर रखती है। क्योंकि यह योनि को बंद करती है, इसे वे लोग चुनते हैं जो निश्चित हैं कि वे अब योनि संभोग नहीं चाहते। यह तेज़, शरीर पर हल्की, और बहुत सफल है — खासतौर पर अधिक उम्र में या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के साथ एक उत्कृष्ट विकल्प।

इस सर्जरी के बारे में

सहारा पुनर्निर्माण के बजाय, colpocleisis **योनि की परत की एक पट्टी हटाकर दीवारों को एक साथ सिलती है**, नलिका को छोटा और बंद करती है ताकि अंग नीचे न झुक सकें। यह गर्भाशय के साथ या उसे हटाने के बाद दोनों तरह से की जा सकती है। लंबे पुनर्निर्माण से बचने के कारण यह तेज़ और कम जोखिम वाली है, सफलता दर **90%** से अधिक है।

मुख्य निर्णय

एक ज़रूरी बात: colpocleisis के बाद **योनि संभोग अब संभव नहीं रहता**, और यह बदलाव स्थायी है। जो लोग इस बारे में निश्चित हैं, उनकी संतुष्टि बहुत अधिक है। आपकी टीम सुनिश्चित करेगी कि यह आपके लिए सही है और आगे बढ़ने से पहले कोई अन्य चिंता न हो।

शब्दों को समझें

Prolapse

जब पेल्विक अंग नीचे खिसककर दबाव या उभार महसूस कराएँ।

Colpocleisis

सर्जरी जो अंगों को सहारा देने के लिए योनि नलिका का अधिकांश भाग बंद करती है।

Obliterative surgery

एक मरम्मत जो योनि को पुनर्निर्माण की बजाय बंद करती है।

LeFort

Colpocleisis का एक प्रकार जो गर्भाशय के साथ ही किया जाता है।

Sling

पेशाब के रिसाव के लिए कभी-कभी एक साथ जोड़ा जाने वाला सहारा।

क्या इसमें दर्द होगा? सर्जरी एनेस्थीसिया (अक्सर spinal या general) के तहत होती है, इसलिए इस दौरान आपको कुछ भी महसूस नहीं होता, और यह आमतौर पर छोटी होती है। बाद में, अधिकांश लोगों को केवल हल्की तकलीफ होती है और वे जल्दी ठीक हो जाते हैं — प्रोलैप्स सर्जरियों में से एक सबसे आसान रिकवरी।

तैयारी कैसे करें

- योनि संभोग न करने के **निर्णय के बारे में निश्चित** रहें।
- अपने **एनेस्थीसिया निर्देशों** का पालन करें (उपवास, blood thinners बंद करें जैसा बताया जाए)।
- Pre-op मूल्यांकन; कभी-कभी यदि पेशाब भी रिसता है तो **sling जोड़ी जाती है**।
- घर पहुँचने और कुछ दिन मदद का इंतज़ाम करें।

क्या होता है

- 1 आप एनेस्थीसिया के तहत होते हैं; antibiotics दिए जाते हैं।
- 2 योनि की परत की पट्टियाँ हटाई जाती हैं और दीवारों को **एक साथ सिला** जाता है, नलिका बंद होती है।
- 3 थोड़े समय के लिए catheter और कभी-कभी vaginal pack रखा जाता है।

बाद में

- अक्सर **उसी दिन या एक रात** की भर्ती; हल्की रिकवरी।
- थोड़े समय के लिए catheter; थोड़ा spotting सामान्य है।
- कई हफ्तों तक **भारी सामान उठाने और जोर लगाने से बचें**; कब्ज का इलाज करें।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- बुखार या ठंड लगना
- अत्यधिक रक्तस्राव
- Catheter निकलने के बाद **पेशाब नहीं हो पा रहा**
- पेल्विक दर्द बढ़ रहा हो

याद रखने योग्य तीन बातें

1. Colpocleisis प्रोलैप्स को सहारा देने के लिए योनि का अधिकांश भाग बंद करती है — तेज़, बहुत टिकाऊ, और कम जोखिम वाली सरल मरम्मत के लिए आदर्श।
2. बदलाव स्थायी है: **योनि संभोग अब संभव नहीं रहता** — इसलिए यह उन्हीं के लिए है जो इस बारे में निश्चित हैं।
3. रिकवरी आमतौर पर आसान है। जोर लगाने से बचें, और बुखार, अधिक रक्तस्राव, या पेशाब में दिक्कत पर तुरंत बुलाएँ।