

# स्तंभन दोष (ED)

WARWIKI

रोगी जानकारी · एक सामान्य, उपचार योग्य समस्या — और हृदय स्वास्थ्य का संकेत

स्तंभन दोष (ED) तब होता है जब संतोषजनक यौन संबंध के लिए पर्याप्त रूप से स्तंभन नहीं हो पाता या बना नहीं रहता। यह बहुत सामान्य है और उम्र के साथ अधिक होता है — लेकिन इसका प्रभावी इलाज संभव है। स्तंभन के लिए स्वस्थ रक्त प्रवाह ज़रूरी है, इसलिए ED हृदय और रक्त वाहिका रोग का प्रारंभिक संकेत भी हो सकता है।

## कारण

स्तंभन के लिए स्वस्थ रक्त वाहिकाएँ, नसें, हार्मोन और मनोदशा सब मिलकर काम करते हैं। ED के आमतौर पर एक से अधिक कारण होते हैं:

- **रक्त प्रवाह** (सबसे सामान्य) — हृदय रोग के जोखिम कारक जैसे diabetes, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान और अधिक वज़न।
- **नसें** — प्रोस्टेट या पेल्विक सर्जरी के बाद, diabetes, या रीढ़ की समस्याओं में।
- **हार्मोन** — कम टेस्टोस्टेरोन।
- **दवाएँ और मनोदशा** — कुछ दवाएँ, तनाव, चिंता, अवसाद या रिश्ते की समस्याएँ।

## हृदय स्वास्थ्य जाँच

लिंग की छोटी धमनियाँ पहले समस्या दिखा सकती हैं, इसलिए नया ED होने पर blood pressure, blood sugar और कोलेस्ट्रॉल की जाँच उचित है — इन्हें नियंत्रित करने से आपके हृदय और स्तंभन दोनों को लाभ होता है।

## शब्दों को समझें

### स्तंभन दोष (ED)

यौन संबंध के लिए पर्याप्त स्तंभन न होना या बना न रहना।

### Vascular

रक्त प्रवाह से संबंधित — ED का सबसे सामान्य कारण।

### PDE5 inhibitor

पहली पंक्ति की ED गोलियाँ (sildenafil, tadalafil आदि)।

### Vacuum device (VED)

एक pump जो लिंग में रक्त खींचकर स्तंभन बनाता है।

### Intracavernosal injection

स्वयं लगाया जाने वाला इंजेक्शन जो स्तंभन उत्पन्न करता है।

### Penile implant

जब अन्य उपाय काम न करें तब की सर्जिकल प्रक्रिया।

**क्या यह ठीक हो सकता है?** लगभग हमेशा हाँ — ED पुरुष स्वास्थ्य की सबसे उपचार योग्य समस्याओं में से एक है। इलाज एक **सीढ़ी** की तरह है: सरल से शुरू करें और ज़रूरत पर ही अगला कदम उठाएँ — हर स्तर पर प्रभावी विकल्प उपलब्ध है।

## इलाज कैसे होता है (चरण दर चरण)

- जीवनशैली और स्वास्थ्य** — व्यायाम, वज़न घटाना, धूम्रपान बंद करना, और diabetes/blood pressure नियंत्रित करना स्तंभन में सुधार करता है; संबंधित दवाओं की समीक्षा करें।
- गोलियाँ (PDE5 inhibitors)** — सामान्यतः पहला उपाय।
- Vacuum device, injections, या urethral suppository** — यदि गोलियाँ पर्याप्त न हों।
- यदि टेस्टोस्टेरोन कम हो तो उसका इलाज; तनाव या रिश्ते की समस्याओं के लिए **counseling**।
- Penile implant** — जब अन्य उपाय काम न करें तब विश्वसनीय सर्जिकल विकल्प। हर विकल्प की अलग जानकारी उपलब्ध है।

## जाँच कैसे होती है

- इतिहास (हृदय जोखिम और दवाएँ सहित) और शारीरिक जाँच
- Blood tests — blood sugar, टेस्टोस्टेरोन, कोलेस्ट्रॉल

## ध्यान रखें

- साथी से बातचीत और मनोदशा/चिंता का इलाज बहुत मददगार होता है।
- ऑनलाइन बिकने वाले अप्रमाणित “supplements” से बचें — कुछ में छुपी दवाएँ होती हैं।

### यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- ED के साथ **सीने में दर्द** या परिश्रम पर साँस फूलना — हृदय जाँच कराएँ
- पेल्विस या लिंग की **चोट के बाद अचानक ED**
- इलाज के दौरान **4 घंटे से अधिक** का स्तंभन (आपातकाल)

## याद रखने योग्य तीन बातें

- ED बहुत सामान्य और अत्यधिक उपचार योग्य है — गोलियों से लेकर implant तक हर स्तर पर प्रभावी विकल्प है।
- यह हृदय/रक्त वाहिका रोग का प्रारंभिक संकेत हो सकता है — जाँच से समग्र स्वास्थ्य बेहतर होता है और जीवनशैली परिवर्तन से स्तंभन सुधरता है।
- अपनी टीम से बात करें। ED के साथ सीने में दर्द, या इलाज पर 4 घंटे से अधिक स्तंभन होने पर तुरंत देखभाल लें।