

5-阿尔法还原酶抑制剂（前列腺缩小药）

WARWIKI

患者须知 · 逐步缩小肥大前列腺的口服药物

5-阿尔法还原酶抑制剂是一类可逐渐缩小肥大前列腺（BPH）的口服药物，能改善尿流、降低尿道梗阻和前列腺手术风险。常用药物有两种：非那雄胺（Proscar）和度他雄胺（Avodart）。此类药物起效缓慢——需坚持服用数月方可见效。

作用原理

此类药物可阻断体内睾酮转化为**双氢睾酮（DHT）**——正是DHT促使前列腺持续增大。DHT水平降低后，前列腺**逐渐缩小**，尿道随之变宽。由于缩小过程需要时间，完整疗效通常在**3至6个月**后显现。此药不能立竿见影，常与起效较快的α受体阻滞剂联合使用。

用药预期

- 最适合**前列腺体积较大**的患者；疗效随时间积累。
- **每日一次**，需长期服用。
- 长期服用可降低**尿潴留**风险及前列腺手术需求。

名词解释

5-ARI

5-阿尔法还原酶抑制剂（非那雄胺、度他雄胺）。

BPH

良性前列腺增生——即前列腺肥大。

DHT

促进前列腺增大的激素；此类药物可降低其水平。

PSA

前列腺特异抗原血液检测；服药后数值约降低一半。

尿潴留

膀胱无法正常排空——长期服药可降低此风险。

非那雄胺／度他雄胺

本类药物的两种常用药。

本药会影响您的PSA检测结果 此类药物可将**PSA血液检测值降低约一半**。这对您的健康无害，但医生需知晓此情况，以便正确解读前列腺癌筛查结果——通常将PSA实测值**乘以2**后再与正常范围比较。请确保每位就诊医生都了解您正在服用此药。

服用方法

- **每日一次**，尽量固定时间服用；需耐心等待，疗效需数月显现。
- 初期感觉无变化，请勿自行停药。
- 通常需长期服用，以维持前列腺缩小效果。

重要安全须知

- **孕妇不得接触**碾碎或掰开的药片（可能影响男性胎儿）；完整的包衣片可正常取用。
- 服药期间及停药后一段时间内，**不得献血**。
- 如出现**情绪变化或抑郁**症状，请及时告知医疗团队。

常见副作用

- 性欲降低、勃起功能障碍或射精量减少
- 乳房触痛或增大
- 部分男性反映性功能影响持续存在——如有顾虑请与医生沟通

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 发现**乳房肿块**、疼痛或乳头溢液
- 出现新发**抑郁**或情绪改变
- 完全无法排尿（请立即就医）

需要记住的三件事

1. 5-ARIs可逐渐缩小前列腺，改善尿流，降低尿潴留和手术风险——需坚持服用3至6个月。
2. 本药可使**PSA值约降低一半**——筛查前列腺癌时，请确保医生知道这一点并相应调整解读。
3. 孕妇不得接触碎裂药片；服药期间不得献血；如出现乳房变化或新发抑郁，请及时告知医生。