

大便失禁 (Fecal Incontinence)

WARWIKI

患者须知 · 无法控制排气或排便 — 常见且可治疗

大便失禁是指无法控制排气或排便 — 还未到达厕所就已漏出，或毫无察觉地漏出。这种情况远比人们想象的更为普遍，尤其在分娩后或随年龄增长时更易发生，且可以治疗。无需为此感到羞耻，告诉您的医疗团队是改善症状的第一步。

关于这种疾病

控制排便依赖于**肛门括约肌**、盆底肌肉、粪便的性状以及协调它们的神经。上述任何环节出现问题都可能导致漏便 — 从粪便污染、排气失控到完全失禁。

病因

- **括约肌损伤** — 常见于分娩时严重撕裂或既往肛门手术
- **稀便或腹泻** — 比成形便更难控制
- **严重便秘**伴溢出性漏便（稀便绕过硬块渗出）
- **神经问题**、直肠脱垂或肠易激综合征

通常多种因素同时存在，其中几项可以得到改善。

名词解释

大便失禁

无意中排出气体或粪便。

肛门括约肌

环绕肛门的肌肉环，在您主动排便前负责收紧肛门。

OASIS

分娩时累及括约肌的严重撕裂（3度或4度）。

膳食纤维

能使稀便成形、减少漏便的膨胀剂。

生物反馈

通过训练重新协调盆底肌和括约肌的治疗方法。

骶神经调控

通过神经刺激改善排便控制的治疗方法。

真的有机会改善吗？ 有 — 大多数患者通过简单措施（如使粪便成形、锻炼肌肉）就能显著改善。必要时更进一步的治疗效果也很好。最难的一步是开口说出来；一旦说出口，就有清晰的改善路径。

如何诊断

- 询问漏便的频率、程度及诱因
- 检查肛门括约肌和盆底
- 必要时进行括约肌超声、肛门直肠测压或内镜检查

如何治疗（逐步进行）

- 1 **调节粪便性状** — 增加膳食纤维使粪便成形，治疗腹泻或便秘，建立规律的排便习惯。
- 2 **盆底肌锻炼／生物反馈**，增强并协调肌肉功能。
- 3 **药物治疗**（如止泻药），适用于粪便稀薄时。
- 4 **进阶治疗** — 骶神经调控、注射填充剂或括约肌修复手术。

日常管理

- 通过摄入膳食纤维和保持适量饮水，使粪便**成形**。
- 定时排便；保护肛周皮肤，外出时随身携带备用物品以增加信心。
- 记录哪些食物会加重漏便（如咖啡因、辛辣食物、人工甜味剂）。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- **粪便带血**，或粪便呈黑色、柏油样
- 排便习惯出现新的或明显变化，或不明原因体重下降
- 发热或严重腹痛

需要记住的三件事

1. 大便失禁很常见且可以治疗 — 您不必默默忍受或保持沉默。
2. 治疗从调节粪便性状和锻炼肌肉开始，必要时再升级为神经刺激或手术修复。
3. 告诉您的医疗团队 — 这是关键的第一步。若出现便血、体重下降或排便习惯明显改变，请及时报告。