

后天性隐匿阴茎 & 手术修复

WARWIKI

患者须知 · 阴茎隐入皮下的原因及手术修复方式

后天性隐匿阴茎（acquired buried penis）是指成年后阴茎隐入下腹部、阴囊或大腿的皮肤与脂肪之下。这种情况可引起卫生问题、反复皮肤感染、站立排尿困难及性功能障碍。它是一种可治疗的重建性疾病——手术可游离并恢复阴茎的正常形态。

关于这种疾病

"后天性"意味着它发生在成年期（与儿童期无害的隐匿阴茎不同）。常见原因包括**体重增加**及下腹部脂肪过多、既往包皮环切或手术留下的瘢痕（**瘢痕**）、慢性皮肤肿胀（**淋巴水肿**），以及一种称为**硬化性苔藓**的瘢痕性皮肤病。

这种疾病往往形成恶性循环：

- 包裹的皮肤长期潮湿，易发生**炎症和感染**。
- 尿液溅到包裹皮肤上，加重刺激和瘢痕形成。
- 随时间推移，卫生护理、排尿和性生活愈发困难。

手术修复的意义

手术旨在**游离阴茎**、切除病变皮肤，并重建健康的覆盖组织，使您能够站立排尿、保持清洁、恢复正常生活——修复术后满意度普遍较高。

名词解释

隐匿阴茎

阴茎被周围皮肤和脂肪遮盖而隐入其中。

腹壁切除术（Panniculectomy）

切除悬垂的下腹部脂肪及皮肤围裙。

耻骨上脂肪切除术（Escutcheonectomy）

切除阴茎上方的脂肪垫。

皮片移植

将健康皮肤移植至阴茎干表面。

硬化性苔藓

可诱发或加重隐匿阴茎的瘢痕性皮肤病。

淋巴水肿

慢性皮肤肿胀，可导致阴茎隐入。

手术前需要先减重吗？ 通常需要——对于因体重引起的隐匿阴茎，减重（有时需转诊减重科）可改善手术效果和持久性，因此医生可能建议在手术前或同期进行。手术本身通常会**同时切除多余脂肪垫**。

手术过程

- 1 将阴茎从束缚其的瘢痕和组织中**游离**出来。
- 2 切除病变或瘢痕皮肤；阴茎干通常用**皮片移植**重新覆盖。
- 3 切除悬垂的脂肪垫或皮肤围裙（**腹壁切除术／耻骨上脂肪切除术**）；必要时对阴囊进行整形。
- 4 有时需要**分期**完成；术后常留置导尿管（导尿管）和引流管。

如何准备

- **体重管理**（必要时转诊减重科）并**戒烟**——两者对愈合影响显著。
- 术前须控制活动性皮肤感染；遵循麻醉指导。
- 安排好家庭帮助和休假——恢复期较长。

之后

- 预计需要**住院**，并在一定时间内留置导尿管和引流管。
- 若使用了移植物，须**保护移植区域**——按医嘱避免坐压该部位。
- 按要求进行伤口护理并逐步恢复活动；保持体重有助于维持疗效。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 发热、皮肤红肿蔓延或伤口异味（感染）
- 移植物或伤口变黑、裂开或大量出血
- **无法排尿**，或导尿管停止引流

需要记住的三件事

1. 后天性隐匿阴茎是阴茎隐入皮肤和脂肪之下，导致卫生、排尿、感染及性功能问题——可通过手术修复。
2. 手术游离阴茎、切除病变皮肤（常用皮片移植覆盖）并切除多余脂肪垫；可能需要分期进行。
3. 减重和戒烟能显著改善疗效。出现发热、移植物变黑或排尿困难时，请立即联系医疗团队。