

α受体阻滞剂（用于前列腺/尿流改善）

WARWIKI

患者须知 · 松弛出口肌肉、改善尿流的口服药物

α受体阻滞剂是一类能够松弛前列腺和膀胱颈肌肉、使排尿更顺畅的口服药物，是治疗**良性前列腺增生（BPH）**引起的排尿症状的常用首选药物。常见药物包括：**坦索罗辛（tamsulosin/Flomax）、alfuzosin、silodosin、doxazosin 和 terazosin**。这类药物起效快，但不会使前列腺缩小。

作用原理

增大的前列腺会压迫排尿通道。α受体阻滞剂可**松弛膀胱出口处的肌肉**，从而增强尿流、减少排尿费力、尿等待和间断排尿。这类药物只缓解**症状** — 不改变前列腺大小，因此停药后效果不再维持。

用药须知

- 通常**起效较快** — 数天至数周内即可感到改善。
- 多为**每日一次**；坦索罗辛须在**每天同一餐后约30分钟**服用。
- Doxazosin/terazosin 应**睡前服用**，并从小剂量起逐步加量，以减少头晕。
- 对于前列腺较大的患者，可与前列腺缩小药物联合使用。

名词解释

α受体阻滞剂

一种松弛膀胱出口肌肉的口服药物。

BPH（良性前列腺增生）

前列腺良性增大。

膀胱颈

膀胱与尿道交界处的肌肉性出口。

逆行射精

精液倒流入膀胱，无害，但射出液体减少或消失。

直立性低血压

站起时血压下降引起的头晕。

IFIS

白内障手术中发生的术中虹膜松弛综合征 — 术前须告知眼科医生。

计划接受白内障手术？ 请务必告知眼科医生您正在（或曾经）服用α受体阻滞剂 — 该药可能导致手术中虹膜"松弛"（IFIS），医生需提前做好应对准备。**即使已停药**，这一情况同样重要，务必告知。

服用方法

- 按医嘱**每天同一时间**服药（坦索罗辛须在餐后约30分钟服用）。
- 服用 doxazosin/terazosin 时，**首剂应在睡前服用**，起床时动作要缓慢 — 首次服药可能引起血压下降和头晕。
- 漏服后不要擅自补服双倍剂量。

重要安全须知

- 起立时动作要**缓慢**，尤其在用药初期，以防头晕或晕厥。
- 与**PDE5抑制剂**或降压药合用时需谨慎，可能加重头晕。
- 服用坦索罗辛/silodosin 时，**逆行射精**（射出液减少或无精液）较常见，无害，停药后可恢复。

副作用

- 头晕或轻度头晕；乏力
- 鼻塞
- 射精量减少或"干射精"

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 晕厥或严重头晕
- 心跳加速或心悸，或胸痛
- 完全无法排尿**（请立即就医）

需要记住的三件事

- α受体阻滞剂能快速松弛膀胱出口，改善BPH引起的排尿症状 — 但只缓解症状，不缩小前列腺。
- 用药初期站起时动作要慢（防头晕），射精量减少或消失是常见现象，无需担心。
- 接受白内障手术前，务必告知**眼科医生**您正在或曾经服用α受体阻滞剂。