

Aquablation（水刀前列腺手术）

患者须知 · 无热、影像引导的前列腺增大治疗

WARWIKI

水刀消融术（Aquablation）是一种治疗前列腺增大（良性前列腺增生，BPH）的新型手术。手术通过尿道，在超声影像引导下，以无热高压水流精准切除阻塞尿道的前列腺组织。与经尿道前列腺切除术（TURP）相比，研究表明该术式可更好地保留射精功能，逆行射精发生率更低。

关于此手术

医生通过内窥镜结合实时**超声**图像精确规划需切除的前列腺组织范围，随后由**机器人控制的高压水流**无热切除组织。术后进行短暂电凝止血，并留置导尿管。

为何选择Aquablation

- **影像引导、精准**，适用于各种前列腺大小（包括体积较大者）
- 尿流改善效果**与TURP相当**
- 相比TURP，**保留射精功能**的概率更高

该术式相对较新，长期数据仍在积累中。

名词解释

Aquablation

以高压水流切除前列腺组织，治疗BPH。

BPH

良性（非癌性）前列腺增生。

无热

利用水压而非热能切除组织。

超声引导

实时影像帮助医生精确规划治疗范围。

逆行射精

无精液射出的高潮—Aquablation后发生率低于TURP。

导尿管

术后留置一两天用于引流膀胱的细管。

与TURP有何不同？ Aquablation通过**超声引导的精准无热水流**而非电切环切除前列腺组织。尿流改善效果与TURP相似，但**保留射精功能**的可能性更高。需要注意的是，该术式较新、长期数据仍在积累，且需短暂电凝止血。

如何准备

- 在**全身麻醉或脊椎麻醉**下进行—请遵守禁食及用药指示（按医嘱停用抗凝药）。
- 术前需做**尿液检查**排除感染。
- 安排人接送；术后留置导尿管时间较短。

手术过程 & 之后

- 1 您将处于麻醉状态；术前给予抗生素。
- 2 超声描绘前列腺，医生规划治疗范围。
- 3 水流切除目标组织，随后短暂止血。
- 4 留置导尿管，通常约**1-2天**后拔除；多数需住院一晚。

术后数周内可能出现**尿液带血**及排尿时轻微烧灼感或尿急；请多饮水，避免用力 and 重体力活动。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 拔除导尿管后**无法排尿**
- **大量出血或血块**堵塞尿流
- 发热或寒战
- 出血持续加重而非减轻

需要记住的三件事

1. Aquablation通过尿道，以精准无热、超声引导的水流切除阻塞的前列腺组织。
2. 尿流改善效果与TURP相当，且更有可能**保留射精功能**；因较新，长期数据仍在积累。
3. 导尿管留置时间短。若出现无法排尿、大量出血或发热，请及时联系医疗团队。