

# 前列腺增生 (BPH)

WARWIKI

患者须知 · 了解排尿症状的原因及治疗方法

前列腺增生——即良性前列腺增生（BPH）——是男性随年龄增长出现的一种极为常见的非癌性前列腺肿大。增大的腺体压迫尿道，引起令人困扰的排尿症状。BPH 不是癌症，也不会导致癌症，且有多种有效治疗方案，从简单的生活方式调整到药物治疗，再到手术。

## 关于这种疾病

前列腺包绕尿道上端。增生后压迫尿道，引起**下尿路症状（LUTS）**：

- 尿流细弱或缓慢、排尿踌躇、费力及间歇性排尿
- 排尿后**膀胱未排空感**及滴沥
- 排尿**频繁**、急迫，夜间起床排尿（夜尿）

## 为何需要重视

BPH 通常影响**生活质量**，但症状严重时可导致尿路感染、膀胱结石、尿潴留（无法排尿），偶尔造成膀胱和肾脏损伤。症状对您的困扰程度决定了治疗的积极程度。

### 名词解释

#### BPH

良性前列腺增生——一种非癌性前列腺肿大。

#### LUTS

下尿路症状——BPH 引起的排尿问题。

#### IPSS

用于评估症状困扰程度的评分量表。

#### 尿潴留

无法排尿——需紧急就医的情况。

#### $\alpha$ 受体阻滞剂 / 5-ARI

治疗 BPH 的两类主要药物。

#### PSA

前列腺特异性抗原血液检测，常作为评估的一部分。

**必须治疗吗？** 只有当症状令您困扰时才需要治疗——轻微症状可以观察随访。当症状影响日常生活时，治疗从生活方式调整逐步升级至药物、再到手术，每个级别都有有效选择。治疗方案还取决于前列腺的大小，医疗团队会为您评估。

## 如何诊断

- **症状评分**（IPSS）及饮水量和用药情况回顾
- 前列腺检查、**尿液检测**以及通常包含 **PSA** 检测
- 尿流率检测及膀胱残余尿量评估

## 如何治疗（逐步升级）

- 1 观察等待与生活方式调整** — 减少傍晚饮水量，限制咖啡因和酒精，养成规律排尿习惯。
- 2 药物治疗** — **α受体阻滞剂**（快速缓解）、**5-α还原酶抑制剂**（缩小较大的前列腺）或两者联用；有时也会使用其他药物。
- 3 微创治疗** — 如前列腺尿道支架置入术或水蒸气消融治疗。
- 4 手术** — TURP（经尿道前列腺切除术）、HoLEP（钬激光前列腺剜除术）、Aquablation（水疗消融）或适用于较大前列腺的单纯前列腺切除术。各术式均有专属宣教资料。

## 需要了解的信息

- BPH 的治疗取决于**您自身**的困扰程度——除非出现并发症，否则无需急于处理。
- 部分感冒或过敏药物（减充血剂）可能加重症状。

### 出现以下情况请联系您的医疗团队：

- **突然无法排尿**（膀胱胀痛）— 需紧急就医
- **血尿**、发热或反复泌尿道感染
- 治疗后症状持续加重

## 需要记住的三件事

- 1.** BPH 是一种常见的非癌性前列腺增生，可引起排尿不畅和尿频症状。
- 2.** 根据症状对您的困扰程度决定治疗方案——依次尝试生活方式调整、药物治疗，再考虑微创或手术治疗。
- 3.** 若突然无法排尿，或出现血尿、发热或反复感染，请立即就医。