

Beta-3 Agonists（用于膀胱过度活动症）

WARWIKI

患者须知 · 一种口干副作用更少的新型膀胱药物

β3受体激动剂（beta-3 agonists）是一类用于治疗膀胱过度活动症（OAB）的新型口服药物，适用于尿急、尿频和急迫性尿失禁。它们通过放松膀胱使其容量增大，且与旧一代抗胆碱能药物相比，口干、便秘和记忆影响等副作用更少。目前该类药物有两种：**mirabegron（Myrbetriq，米拉贝隆）**和**vibegron（Gemtesa，维贝格隆）**。

作用原理

两种药物均可激活膀胱壁上的**β3受体**，从而**放松膀胱逼尿肌**，使膀胱在储尿期保持舒张状态。膀胱更平静后，尿急次数减少，如厕频率降低——其作用途径与抗胆碱能药物不同。

用药预期

- 疗效通常在**数周内**逐渐显现；**每日一次**服用。
- 总体**耐受性良好**——口干症状极少或无。
- 适合**老年患者**，或曾因抗胆碱能药物出现口干等副作用者。
- 对顽固性症状，有时可与抗胆碱能药物联合使用。

名词解释

膀胱过度活动症（OAB）

膀胱过早收缩引起的尿急和尿频。

β3受体激动剂

通过β3受体放松膀胱的口服药物。

Mirabegron / vibegron

该类药物的两个品种。

抗胆碱能药物

较旧的OAB口服药；β3受体激动剂可避免其许多副作用。

血压

Mirabegron可轻微升高血压，需监测。

为何选择这类药而非旧药？ β 3受体激动剂对膀胱过度活动症的疗效与抗胆碱能药物相当，但**口干和便秘的副作用明显更少**，也无记忆方面的顾虑——因此常被优先选用，尤其适合老年患者。主要需关注的是血压变化。

服用方法

- 遵医嘱**每日一次**服用；需数周后显效。
- 配合膀胱训练和盆底肌锻炼，效果更佳。
- 按时复诊，以便医疗团队评估疗效并监测血压。

重要安全须知

- **Mirabegron可升高血压**——需定期监测；若血压过高或控制不佳，应避免使用。（Vibegron对血压影响极小。）
- 告知医疗团队您正在服用的其他药物——mirabegron可能影响部分药物的血药浓度。
- 与所有OAB药物一样，若出现排尿困难，请及时告知医疗团队。

常见副作用

- 通常较轻——头痛、鼻塞
- 血压升高（主要见于mirabegron）
- 尿路感染或轻度便秘

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- **血压显著升高或剧烈头痛**
- **无法排尿**或感觉膀胱未排空
- 面部、嘴唇或舌头肿胀，或呼吸困难（罕见过敏反应）——请立即就医

需要记住的三件事

1. β 3受体激动剂通过放松膀胱缓解过度活动症状，与旧药相比**口干副作用少得多**。
2. 对老年患者或曾出现抗胆碱能药物副作用者尤为适合；需数周见效。
3. Mirabegron可升高血压——请按时复诊。若无法排尿或血压骤升，请立即联系医疗团队。