

膀胱 Botox 注射（用于膀胱控制）

WARWIKI

患者须知 · 通过注射舒缓膀胱过度活动症

膀胱 Botox 注射是治疗膀胱过度活动症的一种方法——适用于经生活方式调整及药物治疗效果不佳、仍有尿急、尿频及急迫性尿失禁的患者。医生通过细小的膀胱镜将微量肉毒杆菌毒素（Botox）注入膀胱肌肉，以舒缓其过度收缩。注射后 1–2 周起效，效果通常维持约 6 个月。

作用原理

膀胱过度活动时，膀胱肌肉会在不该收缩时收缩。Botox **放松该肌肉**，阻止其不受控地收缩，从而减轻尿急、尿频和急迫性尿失禁。注射后不会立即见效，通常需要 **1–2 周** 才能感受到改善。

安全吗？

是的，该疗法已有充分的临床验证。最重要的一点是：由于 Botox 放松膀胱，少数患者可能出现**排尿不畅**——在药效消退前，需要进行**临时自我导尿**。因此，您需要愿意并能够在必要时学会自我导尿。其他不良反应包括尿路感染和短暂血尿。

名词解释

膀胱过度活动症

膀胱过早收缩引起的尿急和尿频。

肉毒杆菌毒素（Botox）

注射后可使肌肉放松的药物。

逼尿肌

被注射的膀胱壁肌肉。

膀胱镜

用于实施注射的细小摄像镜。

自我导尿

插入细管排空膀胱，有时需临时使用。

残余尿量

排尿后膀胱内残留的尿液——操作后会检测。

会疼吗？ 操作前会先向膀胱内注入麻醉药，因此大多数患者在注射过程中只感到轻微压迫感。通常为**局部麻醉**下的门诊操作，约 10–15 分钟，完成后即可回家。

如何准备

- 操作前进行**尿液检查**，排除感染。
- 操作前后可能会给予**抗生素**。
- 告知医疗团队您是否在服用**抗凝药物**，并做好必要时学习自我导尿的准备。

操作过程

- 1 向膀胱内注入麻醉液。
- 2 细小的**膀胱镜**经尿道插入膀胱。
- 3 在膀胱壁多个位点注射 Botox。
- 4 取出膀胱镜——整个过程约 10–15 分钟。

之后

- 排尿时轻微灼烧感或少量血尿持续一两天属正常现象。
- 症状改善在 1–2 周内逐渐显现；效果持续约 6 个月，可**重复注射**。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- **无法排尿**或感觉排尿不畅
- 发热或寒战（可能为感染）
- 大量出血或尿中有血块
- 灼烧感在数日后加重

注意事项

- 操作后通常会**检测膀胱排空情况**。
- 如需重复注射，间隔时间为数月。

需要记住的三件事

1. 膀胱 Botox 注射可放松过度活动的膀胱肌肉，缓解尿急、尿频和急迫性尿失禁；1–2 周起效，效果约维持 6 个月。
2. 这是一项在局部麻醉下进行的快速门诊操作；主要风险是少数患者需要临时自我导尿。
3. 若操作后无法排尿或出现发热，请立即联系医疗团队。