

颊黏膜（脸颊）移植物

WARWIKI

患者须知 · 用于重建尿道或输尿管的口腔颊黏膜移植物

在您的重建手术中，医生会取口腔内壁（脸颊）一小块湿润黏膜 — 即颊黏膜移植物 — 用于重建您的尿道（偶尔也用于输尿管，即连接肾脏与膀胱的管道）。本须知将说明为何选用脸颊组织、手术过程及口腔的感受与愈合情况。

关于这种移植物

口腔内壁覆有坚韧湿润的组织，与泌尿道环境十分相近。医生会从一侧脸颊（较长修复时可取两侧）切取一小块椭圆形黏膜，用于扩宽或重建狭窄部位。取材在**您全身麻醉入睡后、同一次手术中**完成。

为何选用口腔内壁？

- 无毛发，且长期处于湿润环境，与泌尿道条件相近
- 组织坚韧、愈合快、瘢痕少、抗感染能力强
- 在同一次手术中取材，无需在体表额外切口，也不会留下可见瘢痕

安全吗？

安全。颊黏膜取材是尿道手术中成熟可靠的步骤，患者耐受性好、满意度高。医生会避开腮腺导管开口和口角。主要不适来自口腔 — 酸痛、紧绷或麻木 — 通常在术后一两周内明显改善。若需取两侧颊黏膜，不适感会略重，仅在修复范围较大时使用。

名词解释

颊黏膜

口腔内壁（脸颊）的湿润黏膜组织。

移植物

从自身某处取下、用于修复其他部位的组织补片。

尿道

将尿液排出体外的管道。

尿道成形术

修复或重建尿道的手术，颊黏膜移植物是其中一部分。

取材部位

取移植物的部位，即口腔内壁（脸颊）。

全身麻醉

使您在手术全程保持睡眠状态、无痛感的麻醉方式。

腮腺导管

脸颊内侧排出唾液的小开口，医生会避开此处。

张口受限

术后暂时性的口腔紧绷或张口困难，通过轻柔拉伸可缓解。

会疼吗？ 取材在全身麻醉下进行，手术中您不会有任何感觉。术后脸颊会有酸痛感 — 类似咬伤或口腔溃疡 — 并可能感到紧绷或麻木。酸痛感在术后1-2周内明显好转，口腔将持续愈合数周。大多数人术后第二天即可饮水，约一周后可恢复正常饮食。

如何准备（手术前）

- 取材在重建手术中完成，需**全身麻醉** — 请遵循手术常规要求（禁食、停用指定药物）。
- 做好口腔护理** — 认真刷牙漱口；医疗团队可能建议您术前先洁牙。
- 请勿吸烟、使用电子烟或烟草制品** — 这会延缓口腔及移植愈合。术前戒烟效果最佳。

如有以下情况，请**提前告知医疗团队**：

- 曾接受口腔、脸颊或颌部手术，或头颈部放疗
- 存在口腔疾病，或张口受限
- 有嚼烟草或槟榔习惯，或存在口腔问题

手术过程

- 1 整个手术期间您处于全身麻醉状态，口腔被轻柔撑开。
- 2 医生从一侧脸颊（较长修复时取两侧）切取一小块椭圆形黏膜，全程避开腮腺导管开口和口角。
- 3 移植后经修整后，用于扩宽或重建泌尿道狭窄部位。
- 4 脸颊创面通常自然愈合，或用可吸收缝线缝合。

之后（口腔护理）

- 愈合分两阶段**：酸痛和紧绷感在**1-2周内明显改善**，但口腔持续愈合约一个月，麻木感完全消退可能需一个月或更久。
- 初期进食**软糯清淡食物**，避免辛辣、酸性、过热或硬脆食物及酒精。进食后轻柔漱口。
- 每天轻柔**练习张口**以缓解紧绷感。取材在口腔内侧，**体表不留可见瘢痕**。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 发热或寒战
- 口腔出血量多或持续不止
- 口腔疼痛加剧、肿胀或有脓液（感染迹象）
- 完全无法饮水或张口

需要记住的三件事

1. 口腔内壁（脸颊）的一小块湿润黏膜用于重建尿道 — 无毛发、愈合好、体表不留可见瘢痕。
2. 取材在您入睡后的同一次尿道修复手术中完成。准备工作：遵循禁食及用药指示，做好口腔护理，并戒烟。
3. 术后脸颊会有酸痛、紧绷或麻木感 — **1-2周内明显好转，但完全愈合需一个月或更久**。进食软糯清淡食物，轻柔漱口，每日练习张口。如出现发热、大量出血或肿胀加剧，请及时就诊。