

阴道封闭术 (Colpocleisis)

WARWIKI

患者须知 · 一种简单、持久的盆腔器官脱垂修复手术，通过关闭阴道来固定器官

阴道封闭术 (colpocleisis) 是治疗盆腔器官脱垂 (pelvic organ prolapse) 的一种高效、低风险手术。手术通过关闭大部分阴道管，将器官永久托起。由于手术后阴道将关闭，该手术适合确定不再进行阴道性生活的患者。手术时间短、创伤小、成功率高，尤其适合年龄较大或合并其他健康问题的患者。

关于这项手术

阴道封闭术并非重建支撑结构，而是**切除一条阴道壁黏膜，再将两侧壁缝合在一起**，使阴道缩短并关闭，器官因此无法再下垂。手术可在保留子宫或切除子宫后进行。由于无需长时间重建，手术更快速、风险更低，成功率超过**90%**。

关键决定

最重要的一点：阴道封闭术后，**阴道性生活将永久不再可能**。对于确定这一点的患者，满意度非常高。您的医疗团队会在手术前与您充分沟通，确认这是适合您的方案，并排除其他顾虑（例如是否需要先评估子宫状况）。

名词解释

脱垂

盆腔器官下移，导致膨出感或压迫感。

阴道封闭术

通过关闭大部分阴道管来支撑器官的手术。

闭合性手术

关闭（而非重建）阴道的修复方式。

LeFort 手术

在保留子宫情况下进行的阴道封闭术。

吊带

如同时存在漏尿问题，可在手术中一并放置的支撑装置。

会疼吗？ 手术在麻醉下进行（常用椎管内麻醉或全身麻醉），术中不会有任何感觉，且手术时间通常较短。术后大多数患者仅有轻微不适，恢复迅速——是所有脱垂手术中恢复最轻松的之一。

如何准备

- **充分确认决定：**确定不再进行阴道性生活。
- 遵守**麻醉须知**（禁食要求、按医嘱停用抗凝药物）。
- 完成术前评估；若有漏尿问题，可能同时**放置吊带**。
- 安排好接送及术后家中的照料。

过程

- 1 麻醉后使用抗生素预防感染。
- 2 切除阴道壁黏膜条，将两侧壁**缝合在一起**，关闭阴道管。
- 3 放置导尿管，有时短暂使用阴道填塞物。

之后

- 通常**当天出院或住院一晚**，恢复轻松。
- 短期留置导尿管；少量出血属正常现象。
- 术后数周内**避免重体力劳动和用力**；积极处理便秘。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 发热或寒战
- 大量出血
- 拔除导尿管后**无法排尿**
- 盆腔疼痛加重

需要记住的三件事

1. 阴道封闭术通过关闭大部分阴道来治疗脱垂——手术快速、效果持久，适合希望简单低风险修复的患者。
2. 这一改变是永久性的：**术后阴道性生活将不再可能**——请在确定这一点后再选择此手术。
3. 恢复通常较顺利。避免用力，出现发热、大量出血或排尿困难时请及时就医。