

便秘是指排便次数减少、粪便干硬或排便困难。便秘十分常见 — 对盆底健康尤为重要，因为排便时用力过猛会加重脱垂、漏尿及盆腔疼痛。好消息是，大多数便秘通过简单、有效的方法即可改善。

关于这种疾病

正常排便应不费力。便秘的表现包括：每周排便少于三次、粪便干硬或呈块状、需要用力、感到**排便不尽**，或需要用手按压阴道或直肠周围才能排出粪便（称为"会阴支撑"）。

病因

- **膳食纤维和饮水不足**，以及缺乏运动
- **忽视便意**，未及时如厕
- **药物影响** — 阿片类药物、铁剂及某些其他药物
- **盆底问题** — 排便时盆底肌无法放松（"出口型"便秘）
- 结肠蠕动缓慢

"出口型"便秘尤为重要：需通过**盆底康复治疗**，而非单纯使用泻药。

名词解释

便秘

排便次数减少，或粪便干硬、排便困难。

膳食纤维

植物性物质，可软化粪便并增加粪便体积。

渗透性泻药

一种温和的泻药（如聚乙二醇），通过将水分吸入肠道软化粪便。

出口型便秘

因盆底肌无法放松导致排便困难。

生物反馈

通过训练帮助肌肉在排便时正确放松的治疗方法。

会阴支撑

用手按压阴道或直肠附近以辅助排便。

为什么泌尿科医生关注便秘？ 因为排硬便时用力，会对支撑膀胱和盆腔器官的结构产生压力 — 便秘会加重脱垂和尿失禁，而充盈的直肠也会压迫膀胱。改善便秘往往能同时缓解膀胱症状。

如何治疗（分步说明）

- 1 增加膳食纤维、补充水分、加强运动** — 逐步增加膳食纤维（通过食物或补充剂），同时多喝水。
- 2 养成良好如厕习惯** — 有便意时及时如厕，使用脚凳抬高膝盖（模拟蹲姿），**不要用力屏气**。
- 3 温和泻药** — 渗透性泻药（如聚乙二醇）在需要时可安全长期使用。
- 4 出口型便秘**可进行**盆底康复治疗**／**生物反馈**；同时请与医疗团队一起排查可能导致便秘的药物。

健康如厕习惯

- 尽量每天在**固定时间**排便，通常在餐后效果最佳。
- 给自己充裕的时间，切勿强行用力。
- 保持活动 — 每天散步有助于肠道蠕动。

实用提示

- 增加膳食纤维时要**循序渐进**，避免腹胀，并注意足量饮水。
- 刺激性泻药偶尔使用可以，但若需每日使用，请先咨询医生。
- 若主要问题是排便时用力费劲，可能是肌肉协调障碍 — 盆底康复治疗比增加泻药更有效。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 粪便中有**血**，或体重无故下降
- 新发便秘持续不改善，尤其是年龄较大者
- 剧烈腹痛、呕吐，或**完全无法排气排便**（可能是肠梗阻）

需要记住的三件事

- 1. 便秘十分常见，且直接影响盆底健康** — 用力排便会增加脱垂和漏尿。
- 2. 通过增加膳食纤维、补充水分、加强运动、养成良好如厕习惯（使用脚凳、不屏气）及按需使用温和泻药来改善便秘。**
- 3. 若仍需用力排便，请咨询盆底康复治疗。**如出现便血、体重下降或症状突然加重，请及时告知医疗团队。