

膀胱造影

患者须知 · 使用造影剂对膀胱进行X线检查

WARWIKI

膀胱造影是一项简短的膀胱X线检查。通过导尿管向膀胱缓慢注入特殊造影剂，使其在X线下清晰显影。这有助于医生确认修复处是否已愈合且无渗漏，或检查是否存在渗漏、异常通道或尿液向肾脏反流。

关于这项检查

普通X线平片难以清楚显示膀胱。膀胱造影通过注入**造影剂**（显影为白色）来呈现膀胱的形态及其储尿和排尿功能。医生可能在以下情况下开具此检查：

- 确认**手术修复已愈合且无渗漏**——通常在拔除导尿管前进行
- 检查外伤或手术后是否存在**渗漏**
- 发现膀胱与其他器官之间的异常通道（**瘘**）
- 检查尿液是否向肾脏方向倒流（**膀胱输尿管反流**）

造影剂的注入方式取决于您的具体情况：

- 若您**未留置导管**，检查时会临时插入一根细导尿管。
- 若您已有**尿道导尿管**或**耻骨上膀胱造瘘管**，造影剂通常直接经由该管注入——无需另置新管。

安全吗？

安全。膀胱造影是一项常见的低风险检查。X线剂量极小，水溶性造影剂会随尿液排出体外。大多数人仅感到充盈感或轻微压迫感。少见的不良反应——如尿路感染、短暂灼热感或痉挛——通常较轻微，可自行缓解。

名词解释

膀胱造影

向膀胱注入造影剂后拍摄的X线图像。

膀胱

储存尿液的肌性囊袋，排尿时收缩排空。

造影剂

在X线下显影为白色的液体，用于清晰显示膀胱。

导尿管

用于向膀胱注入造影剂的细软管。

耻骨上膀胱造瘘管

经下腹部引流膀胱的导管；造影剂可经此管注入。

瘘

膀胱与其他器官之间的异常通道，可通过造影检查发现。

反流

尿液从膀胱向肾脏方向倒流。

排尿期图像

需要在排尿过程中拍摄的额外X线图像。

会疼吗？ 大多数人在膀胱充盈时只感到胀满感或轻微压迫感，不会有剧烈疼痛。若检查时需要插入导尿管，可能有短暂刺痛感。检查团队可随时放慢速度或暂停——请随时告知他们。整个检查通常约需15–30分钟。

如何准备（检查前）

准备工作极少。大多数情况下：

- 可**正常饮食**，按时服用**日常药物**，除非医生另有交代。
- 若留有导尿管或耻骨上膀胱造瘘管，**保持原位不动**——造影剂通常经此管注入。
- 通常可**自行驾车回家**，因为无需镇静。

提前告知医疗团队，如果您：

- 曾对X线造影剂或碘制剂有过敏反应
- 正在服用抗凝血药物
- 有尿路感染征象（灼热感、发热，或尿液浑浊、气味异常）——活动性感染可能需要推迟检查

检查过程

- 1 您将平躺于X线检查台上。若未留置导管，医生会轻柔插入一根细导尿管；若已有导管，则直接连接。
- 2 造影剂缓慢注入膀胱，同时拍摄X线图像。期间可能请您保持静止、正常呼吸。
- 3 如有需要，可能请您**排尿**，以拍摄膀胱排空时的图像。
- 4 图像经审阅后，取出导尿管——或保留原有导管。

之后

- 通常可立即回家，**恢复正常活动**。
- 排尿时可能有**轻微灼热感**，持续一天左右。多喝水有助于缓解。
- 尿液中可能出现**淡粉色**，属正常现象，通常一天内消退。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 发热或畏寒
- 排尿困难或完全无法排尿
- 大量出血或尿液中有血块
- 腹痛或腹部痉挛持续加重

需要记住的三件事

1. 膀胱造影是一项快速、安全的X线检查，通过向膀胱注入造影剂，确认修复是否愈合，或检查渗漏、瘘管及反流。
2. 几乎不需要特别准备。保留现有导尿管或耻骨上膀胱造瘘管，并提前告知医疗团队任何造影剂过敏史、抗凝药使用情况或尿路感染症状。
3. 大多数人仅感到胀满感，检查后可立即回家。轻微灼热感或尿液淡粉色持续一天属正常——多喝水；如出现发热、大量出血或排尿困难，请及时就诊。