

勃起功能障碍 (ED)

WARWIKI

患者须知 · 一种常见且可治疗的问题 — 也是心血管健康的预警信号

勃起功能障碍 (ED) 是指反复出现无法获得或维持足够勃起以完成满意性生活的问题。ED 非常常见，且随年龄增长发生率升高 — 同时也是高度可治疗的。由于勃起依赖健康的血液循环，ED 还可能是心血管疾病的早期预警信号，因此值得及时评估。

病因

勃起需要健康的血管、神经、激素和情绪协同配合。ED 通常由多种因素共同导致：

- **血流不畅**（最常见）— 与心脏病共享风险因素：糖尿病、高血压、高胆固醇、吸烟和超重。
- **神经损伤** — 前列腺或盆腔手术后、糖尿病或脊柱疾病所致。
- **激素异常** — 睾酮水平低下。
- **药物与情绪** — 某些药物、以及压力、焦虑、抑郁或关系问题。

心血管健康提示

由于阴茎小动脉往往最早出现病变，新发 ED 是检查血压、血糖和胆固醇的好时机 — 控制这些指标既有益于心脏，也有助于改善勃起功能。

名词解释

勃起功能障碍 (ED)

无法获得或维持足够勃起以完成性生活。

血管性

与血流相关 — 是 ED 最常见的原因。

PDE5抑制剂

一线 ED 口服药（sildenafil、tadalafil 等）。

真空负压装置 (VED)

通过负压将血液引入阴茎以产生勃起的装置。

阴茎海绵体注射

自我注射以产生勃起的方法。

阴茎植入物

用于其他方法无效时的 ED 手术装置。

可以治好吗？ 几乎总是可以 — ED 是男性健康领域中治疗选择最多的疾病之一，从口服药到装置再到手术均有有效方案。治疗遵循**阶梯原则**：从简单方法开始，仅在需要时升级，每个阶段均有有效选择。

如何治疗（逐步进阶）

- 1 生活方式与健康管理** — 运动、减重、戒烟以及控制糖尿病和血压，均可切实改善勃起；同时请复查可能有影响的药物。
- 2 口服药（PDE5抑制剂）** — 通常作为首选治疗。
- 3 真空负压装置、注射或尿道栓剂** — 口服药效果不足时的有效替代方案。
- 4 如睾酮偏低可补充睾酮**；如存在压力或关系问题可进行**心理咨询**。
- 5 阴茎植入物** — 其他方法无效时可靠的手术选择。每种方案均有专门的患者须知。

如何诊断

- 病史采集（包括心血管风险因素和用药情况）及体格检查
- 血液检查 — 血糖、睾酮、胆固醇

重要提示

- 与伴侣沟通、改善情绪和焦虑往往大有帮助。
- 警惕网络销售的未经验证“补充剂” — 部分产品含有隐藏药物成分。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- ED 伴有**胸痛**或活动时呼吸困难 — 请尽快进行心脏检查
- ED 在**盆腔或阴茎受伤后**突然出现
- 使用治疗药物后勃起持续**超过4小时**（紧急情况）

需要记住的三件事

- ED 非常常见且高度可治疗，从口服药到植入物，每个阶段均有有效方案。
- ED 可能是心血管疾病的早期信号 — 评估有助于全面健康管理，生活方式改变可改善勃起功能。
- 主动与医疗团队沟通。若 ED 伴有胸痛，或治疗后勃起超过4小时，请立即就医。