

女性性功能障碍（female sexual dysfunction）是指持续存在的性欲、性唤起、高潮或性交疼痛方面的困扰。此问题在各年龄段均很常见，通常由躯体、激素和心理等多种因素共同导致，且大多可以治疗。这是值得与医生坦诚讨论的医学问题，医疗团队会为您提供无评判的帮助。

关于这种疾病

问题通常涉及以下一个或多个方面：

- **性欲** — 对性生活兴趣减低
- **性唤起** — 难以产生或维持性唤起；阴道干涩
- **高潮** — 难以达到性高潮
- **疼痛** — 性行为中或之后不适（性交疼痛症）

病因

通常由多种因素共同作用：

- **绝经／雌激素水平下降** — 阴道干涩和萎缩（GSM）
- **盆底过紧或疼痛**、盆腔器官脱垂或漏尿顾虑
- 基础疾病、既往手术及某些**药物**（如部分抗抑郁药）
- 压力、情绪、睡眠及伴侣关系因素

名词解释

性欲（Libido）

对性行为的渴望或兴趣。

性唤起（Arousal）

身体的生理反应，包括阴道润滑。

性交疼痛症（Dyspareunia）

性行为中或之后出现的疼痛。

GSM

绝经泌尿生殖综合征 — 雌激素水平下降导致的干涩与萎缩。

阴道雌激素

用于缓解干涩和不适的低剂量局部治疗。

盆底物理治疗（Pelvic-floor PT）

针对盆底肌过紧引起疼痛的治疗。

润滑剂／保湿剂

缓解干涩和摩擦的非激素类产品。

这是"心理问题"吗？ 不是。干涩、盆底过紧、脱垂、药物影响等都是真实可治疗的躯体原因，情绪和伴侣关系因素同样重要。全面评估会综合考虑所有方面，大多数人都能获得明显改善。

如何评估

- 关于您困扰和病史的保密沟通
- 体格检查，寻找可治疗的躯体原因（干涩、盆底紧张、脱垂）
- 回顾用药情况及整体健康状况

如何治疗

- 1 **缓解干涩与疼痛** — 使用润滑剂和保湿剂；绝经相关干涩可用阴道雌激素。
- 2 **盆底物理治疗**，改善疼痛或肌肉过紧。
- 3 **处理诱因** — 治疗脱垂、漏尿，或调整降低性欲的药物。
- 4 **心理咨询/性治疗**，关注情绪、压力、睡眠及伴侣关系。

实用建议

- 性行为时使用**润滑剂**，日常定期使用**保湿剂**改善干涩。
- 与伴侣坦诚沟通，有助于减轻压力和疼痛。
- 给治疗留出时间；联合多种方法通常效果更好。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 新发疼痛、**肿块**或异常出血
- 性行为后或绝经后出血
- 对自身关系安全的任何顾虑

需要记住的三件事

1. 性欲、性唤起、高潮或性交疼痛等问题很常见，有真实病因，通常可以治疗。
2. 许多原因是躯体性且可纠正的（干涩、盆底过紧、药物影响）；情绪和伴侣关系因素同样重要。
3. 值得与医疗团队讨论。如出现新发疼痛、肿块，或性行为后、绝经后出血，请及时告知。