

瘻 — 泌尿生殖与直肠阴道

WARWIKI

患者须知 · 导致尿液、气体或粪便渗漏的异常通道

瘻是两个本不相连的器官之间形成的异常小通道。在骨盆区域，它可发生于膀胱（或输尿管/尿道）与阴道之间—导致持续性尿液渗漏—或发生于直肠与阴道之间—使气体或粪便从阴道排出。瘻很难自行愈合，但可以通过手术修复。

关于这种疾病

- **泌尿生殖瘻**（如膀胱阴道瘻）— 日夜持续、无法控制的**尿液从阴道渗漏**。
- **直肠阴道瘻** — **气体或粪便从阴道排出**，反复感染，局部刺激。

症状可能令人痛苦且产生孤立感—但这是一个"管道问题"，有相应的修复方案，并非您的过错。

病因

- **盆腔或妇科手术**（如子宫切除术）— 在许多国家是最常见的原因
- **分娩** — 尤其是产程延长、梗阻性分娩（全球首要病因）
- **放射治疗**、炎症性肠病、感染，或（较少见）肿瘤

名词解释

瘻

连接两个器官的异常通道。

膀胱阴道瘻

膀胱与阴道之间的瘻。

直肠阴道瘻

直肠与阴道之间的瘻。

染料试验

将有色液体注入膀胱或直肠以定位漏口。

膀胱镜检查

用摄像头观察膀胱内部以寻找开口。

Martius皮瓣

用于加固修补处的组织瓣。

造口转流

愈合期间临时改变尿液或粪便流向的方法。

能治好吗？ 可以—大多数瘘都可以修复，许多患者可完全治愈。有时较小的新发瘘在留置导尿管后可自行闭合，但大多数需要计划性手术。时机很关键：医生通常会等到炎症消退后再手术，以提高成功率。

如何诊断

- 体检，通常配合**染料试验**精确定位漏口
- **膀胱镜检查**和影像检查，评估大小、位置及病因
- 排查诱因（放射损伤、感染、炎症性肠病）

如何治疗

- 1 **保守治疗** — 较小的近期尿瘘可通过留置导尿管数周后自行闭合。
- 2 **手术修补** — 经阴道或腹部入路，多层次关闭瘘口。
- 3 **组织瓣加固** — 用健康组织（如Martius皮瓣）加固修补处，尤其适用于放疗后患者。
- 4 **临时转流** — 部分直肠阴道瘘需暂时改变粪便流向，使修补处充分愈合。

温馨提示

- 等待手术期间注意保护皮肤，使用护垫；医疗团队可协助缓解不适。
- **放疗后**的修补更为复杂，通常需要组织瓣。
- 术后可能需留置导尿管，拔管前会进行**愈合评估**。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 发热或寒战，或盆腔疼痛加重
- 出现感染迹象，或大量出血
- 修补术后：导尿管停止引流，或渗漏复发

需要记住的三件事

1. 瘘是异常通道，可导致尿液渗漏（泌尿生殖瘘）或气体/粪便从阴道排出（直肠阴道瘘）。
2. 大多数可以修复—少数小瘘可通过导尿管保守愈合，多数需要计划性手术，有时需用组织瓣加固。
3. 时机至关重要；医疗团队可能会等炎症消退后再手术。术后出现发热、感染迹象或渗漏复发请及时就诊。