

HoLEP（钬激光剜除术）

患者须知 · 适用于任意大小前列腺的激光手术

WARWIKI

HoLEP（钬激光前列腺剜除术）是一种治疗前列腺增大（良性前列腺增生，BPH）的激光手术，通过内镜将内层阻塞组织切除，无需体外切口。其最大优势是不限前列腺大小，包括过去需要开放手术的超大前列腺，出血少，效果持久。

关于这项手术

医生通过尿道置入内镜，用**钬激光**将整个内层前列腺（造成梗阻的部分）从外层包壳剥离 — 如同将果肉从果皮中剥出。游离的组织被推入膀胱，再经**组织粉碎**后取出。由于完整切除了梗阻部分，效果**持久**，很少需要再次治疗。

为何选择 HoLEP

- **适用于任意大小**的前列腺，包括超大前列腺
- **出血少** — 通常适合正在服用抗凝药的患者
- 导尿管留置时间短，效果持久

HoLEP 是一项专科技术，经验丰富的医生能带来最佳效果。

名词解释

HoLEP

钬激光前列腺剜除术。

BPH

良性（非肿瘤）前列腺增生。

剜除

将整个内层前列腺从外层包壳完整切除。

钬激光

用于分离和封闭组织、出血极少的激光。

组织粉碎

将游离组织碎化后取出体外。

逆行射精

干性高潮 — 常见且无害的术后改变。

术后会有哪些变化？ 大多数患者排尿流量有力且持久。与其他前列腺手术相同，**逆行射精**（干性高潮）较为常见。部分患者在最初几周可能出现暂时性尿急或少量压力性漏尿，通常可自行恢复；对勃起功能造成严重影响或出现持续尿失禁的情况并不常见。

如何准备

- 手术在**全身麻醉或椎管内麻醉**下进行 — 请遵守禁食及用药指导。
- 术前需**尿液检查**以排除感染。
- 请安排人接送；导尿管留置时间较短。

过程及术后

- 1 您将在麻醉下入睡或局部麻木；同时使用抗生素。
- 2 激光将内层前列腺剜除，随后粉碎取出。
- 3 留置导尿管，通常约**一天**后拔除；多数患者当天或住院一晚后即可出院。

术后数周内可能出现**血性尿液**及轻微烧灼感或尿急；如医生建议，请进行盆底肌锻炼，并避免用力排便和重体力劳动。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 拔除导尿管后**无法排尿**
- **大量出血或血凝块**堵塞尿道
- 发热或寒战
- 数周内漏尿无好转

需要记住的三件事

1. HoLEP 通过内镜用激光完整切除梗阻的内层前列腺 — **不限大小**，出血少，效果持久。
2. 术后排尿有力；逆行射精（干性高潮）常见，早期尿急或漏尿通常可自行恢复。
3. 导尿管留置时间短。若出现无法排尿、大量出血或发热，请及时就医。