

植入式胫神经刺激 (ITNS)

WARWIKI

患者须知 · 一种植入脚踝附近的小型装置，用于治疗膀胱过度活动症

ITNS 是一种植入脚踝附近的小型装置，通过轻柔刺激胫神经来抑制膀胱过度活动症（OAB）——包括尿急、尿频和急迫性尿失禁。其原理与门诊踝部治疗（PTNS）相同，但因为装置已植入体内，您可以在家中接受治疗，无需每周返院复诊。

作用原理

胫神经位于内踝附近，与控制膀胱的脊神经相连。轻柔刺激胫神经可向膀胱发送信号，**重新调节并抑制**膀胱的过度活动，从而减少尿急和漏尿。植入物持续发送这些脉冲，您无需再反复就诊，也不需要服药，不会产生全身性副作用。

适合我吗？

- 适用于**膀胱过度活动症**（尿急、尿频、急迫性尿失禁），尤其是药物治疗无效或出现副作用时
- 无需服药——适合无法使用膀胱药物的患者
- 常见于曾接受**门诊 PTNS 有效**但难以坚持每周就诊的患者
- 与骶神经“膀胱起搏器”不同，大多数 ITNS 装置**无需先行试验期**

名词解释

膀胱过度活动症

膀胱过早收缩引起的尿急和尿频。

胫神经

脚踝附近与膀胱神经供应相连的一条神经。

神经调控

利用轻柔电脉冲抑制过度活跃的神经。

植入物

通过短小手术置于皮下的小型装置。

可穿戴装置

为部分装置供电和控制的可拆卸脚踝环。

局部麻醉

局部注射麻醉药，使区域无痛，患者保持清醒。

会疼吗？ 装置通过一个**短小的门诊手术**在局部麻醉下植入——您保持清醒，不应感到疼痛，只有轻微压感。治疗时的感觉如同轻微的**麻刺感**或脚趾轻微弯曲，不会疼痛。大多数患者当天即可回家。

操作过程

- 1 通过**脚踝附近的小切口**，将装置置于胫神经旁——通常在局部麻醉下进行，约需 **20–35 分钟**。
- 2 切口缝合后等待愈合；治疗通常在**数周后**开始启动。
- 3 您的医疗团队会调整参数，并指导您如何使用装置。

两种装置类型

- 一种**完全植入、自带电池**——无需佩戴或充电，按设定时间表自动刺激。
- 另一种**内部无电池**，需佩戴一个小型**脚踝环**为其供电，可在家自行开展治疗。
- 您的医生会告知您所用的装置类型及使用方法。

之后

- 脚踝处可能有轻度酸痛或肿胀，持续数天；愈合期间保持伤口清洁干燥，避免剧烈活动。
- 疗效在**数周内逐渐显现**——许多患者症状改善达一半以上，且效果可持续数年。
- 如有需要，装置可**关闭或取出**。MRI 适用性因装置而异——检查前务必告知影像团队您已植入装置。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 脚踝处发红、肿胀、渗液或发热（可能为感染）
- 脚踝植入部位新发或加重的疼痛
- **疗效突然消失**或刺激感异常不适

需要记住的三件事

1. ITNS 是植入脚踝附近的小型装置，可抑制膀胱过度活动——相当于居家版 PTNS，无需服药，无全身性副作用。
2. 手术为短小门诊操作，通常在局部麻醉下进行，大多数装置**无需先行试验期**。
3. 疗效在数周内逐渐出现并可维持数年；如出现脚踝感染、新发疼痛或疗效突然消失，请及时联系医疗团队。