

可膨胀型阴茎假体（IPP）

患者须知 · 阴茎假体手术前须知

WARWIKI

可膨胀型阴茎假体（IPP）是一种完全置于皮下的装置，适用于药物、注射或其他治疗均无效的勃起功能障碍患者，使您可在任意时间获得坚硬勃起。您通过隐藏在阴囊内的泵自行控制。本须知介绍其工作原理、术前准备及术后注意事项。

关于这项手术

当**勃起功能障碍（ED）**在药物、真空装置或注射治疗后仍无改善时，假体植入是满意度最高的下一步选择。手术植入三部件装置，全部隐于皮下：

- 置于阴茎内的两根软**柱体**，充水后使阴茎坚硬
- 位于阴囊内的**泵**，挤压充水，按压放水
- 置于下腹部的液体**储液囊**

使用方法：多次挤压泵，使柱体充水以获得勃起；按压泄压阀使阴茎变软。时间和时长完全由您掌控。

重要须知

这是一项**永久性选择**。植入假体会改变勃起组织，此后自然勃起及其他ED治疗方式（药物、注射）将不再有效 — 假体将成为您获得勃起的唯一方式。重要的是，它**不会影响排尿、感觉、性高潮或射精**。与所有植入物一样，存在一定风险，主要是感染，且装置多年后可能磨损需要更换。

名词解释

勃起功能障碍（ED）

无法获得或维持足够坚硬的勃起以完成性生活。

阴茎假体（IPP）

植入体内、可在您需要时产生勃起的装置。

柱体

置于阴茎内的两个部件，充水后使阴茎坚硬。

泵

位于阴囊内的部件，挤压充水，按压放水。

储液囊

置于下腹部的储液容器。

激活

术后约4–6周的随访，首次启用装置并接受操作指导。

循环锻炼

愈合后每日充水再放水，保持装置正常运作并维持长度。

全身麻醉

手术期间使您入睡、无痛的药物。

会疼吗？ 手术在全身麻醉或脊椎麻醉下进行，过程中您不会有任何感觉。术后阴茎和阴囊会出现酸痛、肿胀和瘀青，持续约两周 — 阴囊托、冰敷和止痛药有助于缓解。手术约需一小时，多数患者当天即可回家。在医生激活装置前，请勿使用假体。

如何准备（术前）

- 手术在**全身麻醉或脊椎麻醉**下进行 — 请遵守所有手术须知（禁食及需暂停服用的药物，包括抗凝药）。
- **预防感染至关重要：**任何感染（包括尿路感染）须先治愈，术前需用抗菌皂淋浴并使用抗生素。
- **请勿吸烟或使用电子烟；**若您有**糖尿病**，医疗团队需要您将血糖控制在良好水平 — 这些措施均可降低感染风险。

请提前告知您的医疗团队，如果您：

- 患有**糖尿病**，或手部灵活性受限（泵需由您自己操作）
- 曾接受盆腔或阴茎手术、放疗，或既往曾植入假体

手术过程

- 1 您在麻醉下入睡或腰部以下失去知觉，同时给予抗生素。
- 2 医生通过阴囊或下腹部的一个小切口，将**柱体**置入阴茎、**泵**置入阴囊、**储液囊**置入下腹部 — 全部隐于皮下。
- 3 装置经测试后保持放水状态以待愈合。必要时可短暂留置导尿管。

之后

- 术后1-2周内阴茎和阴囊会有**肿胀和瘀青**。请佩戴阴囊托、冰敷、服用止痛药，并保持切口清洁干燥。
- **在医生许可前，请勿使用装置或进行性生活** — 通常约**4-6周**。在**激活随访**时，装置将首次充水，并指导您操作泵（放水操作需多加练习）。
- 此后，请**每日充水再放水（"循环锻炼"）**，持续最初数月 — 有助于保持装置顺畅运作并维持长度。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 发热或发冷，或切口处出现加重的红肿、疼痛或渗液
- 无法排尿
- 剧烈或持续加重的疼痛，或阴茎颜色发暗发黑

需要记住的三件事

1. IPP是专为其他治疗无效的ED设计的隐藏装置 — 挤压阴囊泵充水勃起，按压泄压阀放水变软。
2. 这是**永久性选择**（术后自然勃起及药物/注射将不再有效），但**不会影响排尿、感觉、性高潮或射精**。
3. 预防感染最为关键 — 先治愈所有感染、戒烟、使用抗菌皂和抗生素。装置激活前（约4-6周）请勿使用，激活后每日循环锻炼。