

阴茎海绵体注射 (ICI)

WARWIKI

患者须知 · 一种用于治疗勃起功能障碍的自我注射疗法

阴茎海绵体注射（ICI）是一种治疗勃起功能障碍（ED）的方法：用极细的针将少量药物注入阴茎侧面，使阴茎产生勃起。当口服勃起药无效或不适合使用时，可选择此方法。虽然听起来令人紧张，但针头极细，大多数患者几乎感觉不到疼痛，且这是最可靠的非手术治疗方法之一。

关于这种治疗

常用药物为 **alprostadil**，或称为 **bimix**（两联混合）或 **trimix**（三联混合）的复方制剂。药物可松弛勃起组织中的血管，使血液流入。**无论您是否有性兴奋**，通常在 **5~15 分钟内**即可产生勃起，持续约 30~60 分钟。

- **首次剂量需在诊室进行**，以确定正确用量并确认安全性。
- 之后将指导您**在家自行注射**。
- 即使口服药无效（包括前列腺手术后），本方法通常仍然有效。

安全吗？

在严格设定剂量的情况下，对大多数人是安全的。最重要的风险是**异常勃起（priapism）**——勃起持续超过 4 小时，这是紧急情况，需立即就医。其他影响包括轻微酸痛、偶发瘀青，以及长期使用后注射部位可能出现硬结（瘢痕）——轮换注射部位可帮助预防。

名词解释

勃起功能障碍（ED）

无法获得或维持足以进行性行为的勃起。

阴茎海绵体注射

将药物注入阴茎海绵体（勃起组织）内。

Alprostadil

最常用的单药注射剂，用于治疗 ED。

Trimix / Bimix

含两种或三种药物的复方注射制剂。

剂量调整（Titration）

通常在诊室进行，逐步找到适合您的正确剂量。

异常勃起（Priapism）

勃起持续超过 4 小时——医疗急症。

PDE5 抑制剂

口服勃起药（如 sildenafil）；当其无效时可选择 ICI。

会疼吗？ 针头极细，注射在阴茎轴侧面——大多数患者只感到轻微刺痛，而非注射在敏感的顶部或腹侧。注射后轻微酸痛较常见，使用 alprostadil 时尤为如此。医疗团队将全程陪同您完成首次注射，确保安全舒适。

安全使用方法

- 1 首次剂量须在诊室确定——切勿自行增加剂量。
- 2 注射部位为阴茎轴侧面（约 3 点或 9 点方向）；**避开顶部和腹侧**，每次**左右交替**注射。
- 3 注射后用手指按压注射部位数分钟，以减少瘀青。
- 4 严格遵守医疗团队的建议频次——通常 24 小时内不超过一次，每周不超过约 3 次。

注射前准备

- 按要求储存药物（部分复方制剂需冷藏）。
- 告知医疗团队您是否服用**抗凝药**或有心脏病史。
- 如有需要，可携带伴侣一同参加注射培训。

出现以下情况请立即就医：

- 勃起持续**超过 4 小时**（异常勃起）——立即前往急诊；拖延可能造成永久性损伤
- 注射部位出现剧烈疼痛、大量出血或感染迹象
- 注射后出现头晕或胸痛

注意事项

- 随身携带医疗团队提供的剂量和频次说明。
- 如出现新的阴茎硬结或弯曲，请及时告知医生。

需要记住的三件事

1. ICI 用极细针将药物注入阴茎侧面，约 5~15 分钟产生可靠勃起——适用于口服药无效时。
2. 首次剂量在诊室确定；切勿自行加量，每次轮换注射侧，并严格遵守使用频次限制。
3. 勃起持续**超过 4 小时即为急症**——立即前往急诊。