

可塑性阴茎假体

WARWIKI

患者须知 · 用于勃起功能障碍的半硬性可弯曲假体

可塑性阴茎假体（又称半硬性假体）是一对置入阴茎内的坚固可弯曲支撑棒，适用于药物、注射或其他方法均无效的勃起功能障碍（ED）患者。无需充气泵：向上弯曲即可进行性生活，向下弯曲则可隐藏于衣物之下。本手册介绍其工作原理、术前准备及术后注意事项。

关于这项手术

当**勃起功能障碍（ED）**经药物、真空装置或注射治疗无效后，假体植入是最可靠的选择。可塑性假体是最简单的一种——两根表面柔软的可弯曲支撑棒置入阴茎内。阴茎始终保持足够的硬度以完成性生活，由手动调节位置：

- 向上弯曲以进行性生活
- 向下弯曲以隐藏于衣物之下

由于无泵、无储液囊、无液体，它是**最易使用、最耐用**的假体类型——尤其适合手部力量有限、操作充气泵有困难的患者。

重要须知

与所有阴茎假体一样，这是一项**永久性选择**：植入后勃起组织会发生改变，自然勃起及其他ED治疗（药物、注射）将不再有效。它**不影响排尿、感觉、高潮或射精**。与充气式假体相比的主要权衡：阴茎始终保持一定硬度，隐藏稍难，感觉不如自然勃起——但更简单、更耐用。

名词解释

勃起功能障碍（ED）

无法获得或维持足够硬度以完成性生活的勃起。

阴茎假体

置入阴茎内的装置，用于其他治疗无效时帮助获得勃起。

可塑性／半硬性

保持阴茎硬度的可弯曲假体；手动调节位置，无需充气泵。

充气式假体

另一主要类型——通过泵充气和放气；更接近自然感觉，但部件更多。

隐藏

将阴茎向下弯曲，使假体在衣物下不易被察觉。

全身麻醉

使您在手术过程中保持睡眠状态、无疼痛感的药物。

耐用

使用寿命长——无液体部件，几乎没有磨损或故障风险。

会疼吗？ 手术在全身麻醉或脊髓麻醉下进行，术中无任何感觉。术后数周内阴茎和阴囊会有酸痛、肿胀和淤青——阴囊托、冰敷和止痛药有助于缓解。手术时间较短（通常不足一小时），一般为日间手术。在医生许可前请勿使用假体进行性生活。

如何准备（术前）

- 手术在全身麻醉或脊髓麻醉下进行——请遵守所有手术须知（禁食，以及需要停用的药物，包括抗凝血药）。
- **假体植入最关键的是预防感染：**任何感染（包括尿路感染）必须先行治疗；您需要用消毒皂淋浴，并使用抗生素。
- **请勿吸烟或使用电子烟；**若您有糖尿病，医疗团队会要求您将血糖控制良好——这些措施均可降低感染风险。

请提前告知您的医疗团队，如果您：

- 有糖尿病或任何影响伤口愈合的疾病
- 曾接受盆腔或阴茎手术、放疗，或曾植入过假体

手术过程

- 1 您将在麻醉下保持睡眠或腰部以下麻木状态，并提前使用抗生素。
- 2 医生通过一个小切口，将可弯曲支撑棒分别置入阴茎两个海绵体内。无需泵或储液囊。
- 3 切口缝合，阴茎保持向下位置。术中可能短暂放置导尿管。

术后护理

- 阴茎和阴囊肿胀淤青将持续1-2周。请佩戴阴囊托，冰敷，按时服用止痛药，保持切口清洁干燥。
- **在医生许可前请勿使用假体进行性生活——**通常为4-6周，待完全愈合后。
- 愈合后**无需学习使用泵**——只需向上弯曲即可使用，向下弯曲即可隐藏。医疗团队会为您示范操作方法。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 发热或寒战，或切口处出现逐渐加重的红肿、疼痛或渗液
- 无法排尿
- 剧烈或持续加重的疼痛，或阴茎颜色变暗发紫

需要记住的三件事

1. 可塑性假体是置入阴茎的两根可弯曲支撑棒——向上弯曲用于性生活，向下弯曲隐藏于衣物。无需充气泵，是最简单、最耐用的假体类型。
2. 这是一项**永久性选择**（之后自然勃起及药物/注射将不再有效），但**不影响排尿、感觉、高潮或射精**。
3. 预防感染至关重要：先治疗所有感染，戒烟，控制糖尿病，使用消毒皂和抗生素。在医生许可前（约4-6周）请勿进行性生活。