

夜尿 (nocturia) 是指夜间从睡眠中醒来排尿一次或多次。这种情况非常常见，随年龄增长尤为突出，但并非无法改善——它会影响睡眠质量、导致白天疲乏，并增加夜间跌倒的风险。一旦找到原因，大多数情况都可以得到有效治疗。

关于这种疾病

夜间需要起身排尿主要有三类原因，许多患者同时存在**多种原因**：

- **夜间产生尿液过多**（夜间多尿）——与傍晚大量饮水、摄入咖啡因或酒精、腿部水肿、心脏或肾脏问题、睡眠呼吸暂停，以及利尿药的使用有关。
- **膀胱储尿量减少**——由膀胱过度活动症或前列腺增生引起。
- **睡眠质量差**——因其他原因醒来后顺便排尿。

为何重视

除睡眠受扰外，夜间起身是老年人发生**跌倒和骨折**的主要原因之一。由于夜尿往往提示可治疗的潜在问题（有时与睡眠呼吸暂停或心脏疾病有关），值得认真评估，而非置之不理。

名词解释

夜尿 (Nocturia)

夜间从睡眠中醒来排尿。

夜间多尿 (Nocturnal polyuria)

夜间产生的尿量占全天尿量的比例过高。

排尿日记 (Frequency-volume chart)

记录白天和夜间排尿时间及尿量的日志。

膀胱过度活动症 (Overactive bladder)

膀胱频繁发出强烈尿意、储尿量减少。

睡眠呼吸暂停 (Sleep apnea)

一种睡眠期间呼吸障碍，可导致夜间尿量增多。

去氨加压素 (Desmopressin)

适用于部分患者、可减少夜间尿量的药物。

第一步：记录排尿日记 坚持几天写**排尿日记**——记录每次饮水和排尿的时间及量——是您能做的最有价值的一件事。它能帮助医疗团队判断**哪种原因**导致了您的夜尿，从而决定治疗方向。

如何诊断

- **排尿日记**，以及对饮水习惯、用药情况和睡眠质量的综合评估
- **尿液检测**，以及前列腺增生或膀胱过度活动症的筛查
- 必要时排查**腿部水肿**、**睡眠呼吸暂停**或心脏、肾脏疾病

如何治疗

- 1 **调整傍晚习惯**——睡前3~4小时内限制饮水，避免咖啡因和酒精。
- 2 **针对腿部水肿**——下午抬高双腿、穿弹力袜，并遵医嘱在白天早些时候服用利尿药。
- 3 **治疗膀胱问题**——积极处理膀胱过度活动症或前列腺增生。
- 4 **针对性药物或睡眠治疗**——如真正因夜间多尿可考虑去氨加压素（desmopressin），或治疗睡眠呼吸暂停。

夜间安全

- 保持**夜灯**常亮，确保去卫生间的通道畅通，防止跌倒。
- 起身时动作放慢，尤其是服用降压药的患者。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- **血尿**、排尿疼痛或发热（可能为感染）
- 服用去氨加压素期间出现**恶心、头痛或意识混乱**（可能为低钠血症）
- 腿部水肿、呼吸急促，或尿量明显变化

需要记住的三件事

1. 夜尿很常见，会影响睡眠并增加跌倒风险，但通常有可治疗的原因。
2. 坚持几天排尿日记是找到病因、选择正确治疗的关键第一步。
3. 调整傍晚饮水管理、控制腿部水肿，并积极治疗膀胱或睡眠问题；保持夜灯和畅通通道以预防跌倒。