

欧普乐药物涂层球囊（Optilume）

患者须知 · 一种通过球囊和药物治疗尿道狭窄的微创方法

WARWIKI

欧普乐（Optilume）是一种治疗尿道狭窄（尿道管腔变窄）的微创手术。特制球囊轻柔扩张狭窄处，同时将药物释放至尿道壁，帮助防止再次瘢痕闭合。无需切开，无需体外切口。

关于这项操作

尿道狭窄是指尿道某段因瘢痕而变窄，导致尿流减弱。单纯扩张或切开后，狭窄常常复发。欧普乐同时实现两个目标：

- 球囊扩张瘢痕段。
- 球囊上的药物涂层（紫杉醇，paclitaxel）被输送至组织，减缓瘢痕再生。

本操作适合部分复发性狭窄患者，狭窄位于球部尿道（阴囊下方），长度短于约3厘米，且曾经历过扩张或切开治疗。其效果比单纯扩张更持久，但并非等同于尿道成形术（开放修复），后者是最持久的治疗方案。您的医生会为您说明哪种方案更适合。

安全吗？

欧普乐通过尿道操作，微创、门诊即可完成。总体耐受性良好，药物剂量小且局限于局部。风险包括血尿或血精、短暂灼热感、尿路感染，以及狭窄随时间仍有可能复发。

名词解释

尿道

将尿液从体内排出的管道。

狭窄

尿道内因瘢痕形成的变窄处，导致尿流减弱。

球部尿道

位于阴囊下方的尿道段，是本治疗效果最佳的部位。

药物涂层球囊

可扩张狭窄并向尿道壁输送药物的球囊。

紫杉醇

球囊上的药物，有助于防止瘢痕复发。

扩张

扩大狭窄处——此处通过球囊完成。

膀胱镜

用于定位和评估狭窄的细长摄像镜。

导尿管

操作结束后短时间内置于尿道的软管。

会疼吗？ 操作在麻醉或镇静下进行，过程中无任何感觉。术后可能出现轻度灼热感、盆腔或阴茎酸胀，以及短暂血尿或血精。通常会短时间留置导尿管。整个操作时间较短，多数患者当天可出院。

如何准备（操作前）

- 遵守**麻醉或镇静的指导**（禁食要求，以及需要暂停哪些药物，包括抗凝药）。
- **尿液检查**排除感染——如有感染，须先治疗。
- **安排接送**，并做好短时间留置导尿管的准备。

请提前告知您的医疗团队，如果您：

- 正在服用**抗凝药**，或目前有尿路感染
- **有生育计划**——由于药物原因，您的医疗团队会要求您在指定时间内使用安全套，并避免尝试生育

操作过程

- 1 您在麻醉或镇静状态下，膀胱镜确认狭窄的长度和位置。
- 2 一根细导丝穿过狭窄处，预先扩张至可容纳球囊的程度。
- 3 药物涂层球囊定位于瘢痕处并充气保持一定时间，将药物输送至组织。
- 4 取出球囊和镜子，留置导尿管短时间。

之后

- 导尿管将在**短时间后**拔除；具体时间由您的医疗团队告知。
- 预期**轻度灼热感及数日内出现淡红色尿液或精液**，多饮水有助缓解。
- 短期内**避免剧烈活动**，并按时复诊进行尿流或症状评估。
- 按照医疗团队建议的时间内**使用安全套**，原因是药物影响。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 发热或寒战
- **无法排尿**，尤其是拔除导尿管后
- 大量出血，或尿液中有血块
- 疼痛持续加重而非好转

需要记住的三件事

1. 欧普乐通过球囊扩张尿道狭窄，同时输送药物以**减少瘢痕再生**——是内镜选择，不能替代开放尿道成形术。
2. 准备工作：遵守禁食和用药指导，先治疗任何感染，安排接送，如有生育计划须提前告知医生。
3. 术后数日内轻度灼热感及少量血尿或血精属正常现象。按建议使用安全套；出现发热、大量出血或无法排尿时请立即联系医疗团队。