

PDE5抑制剂（勃起功能障碍及前列腺用药）

WARWIKI

患者须知 · 用于勃起功能障碍及前列腺排尿症状的口服药物

PDE5抑制剂（PDE5 inhibitors）是一类用于治疗勃起功能障碍（ED）的口服药物，其中tadalafil还可缓解前列腺增大引起的排尿症状。常用药物包括sildenafil（Viagra）、tadalafil（Cialis）、vardenafil和avanafil。这类药物在性刺激下帮助产生勃起——不会自动引发勃起。

作用原理

这类药物舒张阴茎血管，使血液充盈其中。关键在于，它们仅在性刺激下起效——您仍需有性唤起，药物本身不会自动引发勃起。Tadalafil还能舒张前列腺和膀胱的肌肉，因此低剂量每日服用可改善尿流。

用药预期

- Sildenafil / vardenafil / avanafil 约30–60分钟起效，持续数小时。
- Tadalafil 长效（可达约36小时，称为"周末药"），也可每日低剂量服用。
- 高脂饮食可延迟 sildenafil 起效；tadalafil 不受食物影响。
- 可能需要几次尝试才能找到适合的剂量和时机。

名词解释

PDE5抑制剂

包括sildenafil、tadalafil等用于治疗ED的一类口服药物。

勃起功能障碍（ED）

无法获得或维持足够硬度的勃起以完成性行为。

硝酸盐类药物（Nitrates）

治疗心脏病/胸痛的药物，绝对不能与这类药物同时使用。

按需服用 vs. 每日服用

性行为前服用，或每日低剂量服用。

良性前列腺增生（BPH）

前列腺增大；tadalafil亦可改善其排尿症状。

阴茎异常勃起（Priapism）

勃起持续超过4小时——属于医疗急症。

最重要的一条禁忌 严禁将这类药物与**硝酸盐类药物**（如nitroglycerin或isosorbide，用于胸痛）或“poppers”（亚硝酸戊酯）同时使用。两者合用可导致**血压骤降，危及生命**。请告知所有医疗人员您正在服用PDE5抑制剂。

服用方法

- 按处方**规范服用**——性行为前按需服用，或每日固定服用。
- 按需服用sildenafil时，建议**空腹或少食后**服用以加快起效。
- 除非医嘱允许，24小时内不得超过一次剂量。

重要安全须知

- **禁用硝酸盐类药物及poppers**——任何情况下均不可合用（见上文）。
- 与**α受体阻滞剂**及其他降压药合用时需谨慎（可能叠加导致头晕）——医生会调整用药间隔或剂量。
- 若您患有**明显心脏疾病**，请先与医生确认性行为和这类药物对您是否安全。
- 限制**饮酒**，酒精会加重头晕。

常见副作用

- 头痛、面部**潮红**、鼻塞、消化不良
- 背部或肌肉酸痛（tadalafil更常见）
- 短暂**视物带蓝色**（sildenafil / vardenafil）

出现以下情况请立即就医：

- 勃起持续**超过4小时**（阴茎异常勃起）
- **突发视力或听力丧失**——立即停药并就医
- **胸痛、晕厥或严重头晕**

需要记住的三件事

1. PDE5抑制剂在**性刺激下**帮助勃起（不会自动起效）；tadalafil还可改善前列腺排尿症状。
2. **严禁与硝酸盐类药物或poppers合用**——血压骤降可危及生命。
3. 勃起超过4小时或突发视力/听力丧失，请立即就医。