

盆腔器官脱垂（POP）是指支撑膀胱、子宫或直肠的组织变弱，导致一个或多个器官压入或突出阴道。这会引**起膨出或压迫感**。此病非常常见，不危险，也不是癌症，可选择盆底锻炼、支撑装置或手术等多种有效方法。

关于这种疾病

脱垂以下垂的阴道壁命名：

- **前壁**（膀胱）— 膀胱膨出（cystocele）
- **后壁**（直肠）— 直肠膨出（rectocele）
- **顶部**（子宫，或子宫切除后的阴道顶端）

常见症状：

- 阴道口可见或可触及的**膨出或肿块**
- 盆腔**压迫感或坠胀感**，傍晚或提重物后加重
- 膀胱或肠道排空困难；有时需按压膨出部位才能排出（"辅助排空"）

病因

任何使盆底支撑结构受损的因素：**妊娠和分娩**、更年期和衰老、长期用力（便秘或慢性咳嗽）、重体力劳动、既往盆腔手术、体重过重及遗传倾向。

名词解释

脱垂

盆腔器官从正常位置下移。

膀胱膨出

膀胱向阴道前壁突出。

直肠膨出

直肠向阴道后壁突出。

阴道穹隆

阴道顶端，子宫切除后可能下垂。

子宫托

放置于阴道内的可取出支撑装置，用于托起器官。

辅助排空

按压膨出部位帮助排空膀胱或肠道。

盆底

支撑盆腔器官的肌群。

POP-Q

用于测量脱垂程度的检查方法。

必须治疗吗？ 只有在症状困扰您时才需要治疗。脱垂本身不危险，症状轻微可以观察。当影响舒适度或日常生活时，可选择多种有效方案—没有唯一“正确”答案，您可以随时改变选择。

如何诊断

- **盆腔检查**，通常在站立或用力屏气时进行，以观察哪个壁下垂及程度
- 回顾膀胱和肠道症状
- 如同时伴有漏尿，有时需进行**膀胱功能检测**

如何治疗（逐步选择）

- 1 **观察等待**（症状不重时），同时预防：治疗便秘、避免重体力劳动、控制体重。
- 2 轻度脱垂可行**盆底肌锻炼或物理治疗**。
- 3 **子宫托**—无需手术的可取出支撑装置，可缓解膨出。
- 4 **手术**—修复支撑结构、阴道封闭术（colpocleisis）或悬吊术，各有对应须知。

日常管理

- 保持大便通畅，**避免用力屏气**；提重物请遵医嘱。
- 坚持盆底肌锻炼；控制咳嗽和体重。
- 子宫托可作为长期解决方案，而非临时措施。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 您**无法排尿**或无法排便
- 膨出处出现**疼痛、出血或溃烂**
- 发热，或膨出无法推回原位

需要记住的三件事

1. 脱垂是盆腔器官下垂引起的常见病，不危险，主要表现为膨出或压迫感。
2. 只有症状困扰您时才需治疗—可选观察、锻炼、子宫托或手术。
3. 避免用力屏气和重体力劳动。若无法排空膀胱或肠道，或膨出处疼痛、溃烂，请及时就医。