

阴茎折叠术

患者须知 · 矫正阴茎弯曲的手术（阴茎硬结症）

WARWIKI

阴茎硬结症（Peyronie's disease）是阴茎内部形成瘢痕组织（斑块），导致勃起时阴茎弯曲，有时使性生活困难。阴茎折叠术通过在阴茎较长侧缝合折叠，使两侧长度趋于一致，从而矫正弯曲。本须知将介绍手术原理、术前准备及术后注意事项。

关于这项手术

阴茎硬结症中，瘢痕组织使阴茎一侧收紧，勃起时产生弯曲。折叠术通过缝合缩短**较长（外侧）**的一侧，使两侧长度匹配，从而矫直阴茎。无需切除瘢痕，也无需使用移植物——这是最简单、最短的矫直手术，**出现新的勃起问题风险最低**。

适合以下情况：

- 弯曲程度中等，形态不太复杂
- **勃起功能良好**（无论是否借助药物）
- 阴茎足够长，可以接受少量缩短

需要了解的事项

主要权衡是阴茎会有一定程度的**缩短**——通常约1-2厘米。许多患者会高估缩短幅度；由于弯曲得到矫正，可用的直线长度往往与术前相当。约**十分之九**的患者能获得足以进行性生活的勃起。您可能会**在皮下摸到缝线**（常见，通常无明显不适）。手术目标是使阴茎足够直以便舒适性生活，而非追求完全笔直。

名词解释

阴茎硬结症（Peyronie's disease）

阴茎内的瘢痕，导致勃起时弯曲。

斑块

引起弯曲的瘢痕组织。

折叠术（Plication）

通过缝合缩短较长侧来矫直阴茎。

人工勃起

在手术室通过注射制造的勃起，供医生测量和评估弯曲程度。

包皮环切术

切除包皮——若您未行包皮环切，有时会在同一手术中进行。

真空装置

愈合期间有时使用的泵，有助于保持阴茎长度和勃起功能。

全身麻醉

使您在手术期间保持睡眠状态、无疼痛感的麻醉药物。

会疼吗？ 手术在全身麻醉、脊髓麻醉或局部麻醉下进行，术中不会有任何感觉。术后阴茎会出现肿胀、瘀伤和酸痛，持续1-2周——冰敷、支撑性内裤和止痛药有助于缓解。手术时间较短（通常约一小时），通常当天即可回家。术后可能短暂留置导尿管。

如何准备（术前）

- 手术在**全身麻醉、脊髓麻醉或局部麻醉**下进行——请遵守所有术前须知（禁食及需暂停的药物，包括抗凝血药）。
- 您的阴茎硬结症应处于**稳定期**（弯曲程度和疼痛已稳定数月）——由您的医生确认手术时机是否合适。
- **请勿吸烟**；任何感染须先治疗，术前会给予抗生素。若未行包皮环切，可能在同一手术中进行——请咨询您的医生。

请提前告知您的医疗团队，若您：

- **勃起功能较弱**或正在服用辅助勃起的药物
- 正在服用抗凝血药，或曾接受过阴茎手术

手术过程

- 1 在麻醉下进入睡眠或麻木状态，并给予抗生素。
- 2 通过**注射制造人工勃起**，供医生观察弯曲程度，然后在较长侧缝合折叠以矫直阴茎。
- 3 再次制造人工勃起检查效果，随后缝合皮肤（如有需要，同时行包皮环切术）。

之后

- 术后1-2周会出现**肿胀、瘀伤和酸痛**。请冰敷、穿支撑性内裤、按需服用止痛药，并保持局部清洁。
- 若留置了导尿管，通常在术后次日早晨拔除。
- **约4-6周内避免性生活**，以使修复部位充分愈合。
- 医疗团队可能建议您在愈合期间每日服用**低剂量勃起药物**和/或使用**真空装置**，以帮助保持长度和勃起功能。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 发热或畏寒，或伤口出现进行性红肿、疼痛加重或分泌物
- 无法排尿
- 严重或加重的肿胀、疼痛，或大量出血

需要记住的三件事

1. 折叠术通过缝合阴茎较长侧来矫直弯曲——无需切除瘢痕，无需移植植物。这是最简单的矫直手术，出现新勃起问题的风险最低。
2. 代价是阴茎会有一定**缩短**（通常1-2厘米），但矫正弯曲后可用长度往往得到恢复；约十分之九的患者能获得足够直的勃起。皮下可能摸到缝线。
3. 手术前阴茎硬结症须已稳定；请勿吸烟。术后约4-6周内避免性生活，并遵循愈合计划（药物／真空装置）。如出现发热、严重肿胀或排尿困难，请及时联系医疗团队。