

阴茎牵引治疗

WARWIKI

患者须知 · 一种通过温和牵拉缓解弯曲的穿戴式装置

阴茎牵引治疗（penile traction therapy）使用一种装置，对阴茎施加温和、持续的牵拉。主要用于阴茎硬结症（佩罗尼病，**Peyronie's disease**）——减轻弯曲、帮助保持长度；也用于阴茎康复，例如假体术后维持长度。该治疗无需手术、安全可靠，但须每日坚持数月方能见效。

作用原理

持续温和的张力促使组织和瘢痕（硬斑）逐渐**重塑**，从而减轻弯曲、帮助保持长度。效果温和且缓慢——这是一种循序渐进的疗法，而非速效手段。通常与其他佩罗尼病治疗方案联合使用。

治疗预期

- 每天按照所用型号的说明**佩戴规定时长**（部分型号需持续佩戴较长时间；较新型号每天分数次短时使用）。
- 效果需经过**数月**积累——坚持是关键。
- 在佩罗尼病**活动期**或与其他治疗联合使用时，效果通常最佳。

名词解释

牵引治疗

使用装置对阴茎施加温和牵拉，逐步发挥作用。

阴茎硬结症（佩罗尼病）

瘢痕组织导致阴茎弯曲，是牵引治疗的主要适应症。

硬斑

牵拉有助于重塑的瘢痕组织。

阴茎康复

维持长度／功能，例如假体术后。

活动期与稳定期

佩罗尼病弯曲是否仍在进展或已趋于稳定。

真的有效吗？ 坚持数月规律使用，可使弯曲和长度获得**适度、真实的改善**。可将其理解为阴茎的物理治疗：效果循序渐进，依赖持之以恒。单独使用无法完全矫正严重弯曲，与注射或手术联合效果更佳。

安全使用方法

- 1 严格遵照装置说明中的**佩戴时长和张力**设置——切勿过度拉紧。
- 2 在阴茎松弛状态下使用；出现**麻木、颜色改变或疼痛**时立即停止。
- 3 逐渐延长佩戴时间，让身体慢慢适应。
- 4 保持装置清洁，按指导定时休息。

温馨提示

- 装置隐蔽，可在家使用；许多患者将其与其他佩罗尼病治疗方案联合使用。
- 需要耐心——以月为单位评估效果，而非以天计算。
- 请向医疗团队咨询推荐的装置型号和使用计划。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 阴茎**麻木**或出现发冷、苍白、发紫且未能迅速恢复
- 持续疼痛、皮肤破损或溃疡
- 弯曲加重或出现新硬块

常见反应

- 装置接触部位出现暂时性发红或压痕
- 轻度不适，适应后会缓解

需要记住的三件事

1. 阴茎牵引治疗通过温和牵拉减轻佩罗尼病弯曲、帮助保持长度——无需手术，安全可靠。
2. 须**每日坚持数月**方能见效；效果循序渐进且适度，常与其他治疗方案联合使用。
3. 切勿过度拉紧。出现麻木、颜色改变或持续疼痛时，请立即停用并联系医疗团队。