

经皮胫神经刺激 (PTNS)

WARWIKI

患者须知 · 通过脚踝处的温和神经刺激治疗膀胱过度活动症

PTNS 是一种无需用药的门诊治疗方法，用于改善膀胱过度活动症（OAB）——包括尿急、尿频和急迫性尿失禁。医生在脚踝附近置入一根极细的细针，向胫神经输送微弱电脉冲。胫神经与控制膀胱的神经共享同一传导通路，经过一系列治疗后，过度活跃的膀胱信号将逐渐平息。

作用原理

胫神经位于内踝附近，与支配膀胱的脊神经相连。温和刺激该神经所发出的信号可重新调节和平息膀胱的过度活动，减少尿急感和排尿次数。整个过程无需用药，也不会产生全身性副作用。

适合我吗？

- 当生活方式调整效果不足，且您希望**避免用药**（或药物引起副作用）时，PTNS 是良好选择
- 无药物——适合无法耐受膀胱药物的患者
- 需要**坚持按疗程治疗**，才能产生并维持疗效

名词解释

膀胱过度活动症

膀胱过早收缩引起的尿急和尿频。

胫神经

脚踝附近的一条神经，与膀胱的神经供应相连。

神经调节

利用微弱电信号平息过度活跃的神经。

经皮

通过皮肤——经由细针电极进入。

维持治疗

定期进行的后续治疗，以保持疗效。

会疼吗？ 大多数患者只感到轻微刺痛、脉冲感或脚趾轻微蜷曲——并不疼痛。每次治疗约 **30 分钟**，您可舒适地坐着完成，治疗后即可自行驾车回家并恢复正常活动。

过程

- 1 您坐下并将腿部支撑好，医生将一根**极细的针电极**置于内踝附近。
- 2 小型设备输送**温和脉冲**，持续约 30 分钟。
- 3 治疗结束后取出针头——两次就诊之间体内不残留任何物品。

治疗安排

- 通常初始阶段为**每周一次，共 12 周**。
- 有效应答者此后需定期进行**维持治疗**，以保持疗效。
- 部分中心还提供**可植入式胫神经刺激装置**，供长期居家刺激使用。

重要提示

- 请坚持完成**完整的 12 周疗程**——疗效会随治疗逐步积累。
- 无需用药、无需手术、无需恢复期。
- 需要持续治疗；停止后疗效可能减退。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 脚踝针刺部位出现发红、肿胀或渗液
- 出现发热，或治疗后脚踝明显疼痛
- 膀胱症状突然加重

需要记住的三件事

1. PTNS 通过脚踝处的温和神经刺激平息膀胱过度活动症——无需用药，无全身性副作用。
2. 通常每周一次，共 12 周，之后进行维持治疗；每次约 30 分钟，无痛苦。
3. 请坚持完整疗程，并计划定期维持治疗以持久保持疗效。