

阴道分娩时，阴道与肛门之间的区域（会阴）可能发生撕裂。三度撕裂延伸至肛门括约肌；四度撕裂穿透括约肌进入直肠黏膜。这类损伤统称为产科肛门括约肌损伤（OASIS），分娩后会立即进行修复，经过妥善护理，大多数患者可以恢复良好。

发生了什么

肛门括约肌是控制气体和粪便排出的环形肌肉。严重撕裂会损伤此肌肉，因此需要精心修复和随访，以保护您长期的排便控制功能。这类撕裂并非您的过失，与您所做的任何事情无关。

修复过程

修复通常在分娩后立即进行，在具备良好麻醉条件（通常为脊椎麻醉或硬膜外麻醉）的手术室或产房内完成。医生将**逐层**重建组织——重新连接括约肌，四度撕裂还需修复直肠黏膜——并使用可吸收缝线。术后您将接受抗生素治疗，并获得疼痛管理和排便护理方案。

名词解释

会阴

阴道与肛门之间的区域。

OASIS

产科肛门括约肌损伤，即三度或四度撕裂。

肛门括约肌

控制气体和粪便排出的环形肌肉。

三度撕裂

撕裂延伸至肛门括约肌。

四度撕裂

撕裂穿透括约肌进入直肠黏膜。

大便软化剂

保持粪便柔软、避免愈合期间用力排便的药物。

盆底物理治疗

愈合后重建盆底肌力量和协调性的康复治疗。

会留下长期问题吗？ 大多数患者愈合良好，恢复正常排便控制。少数人可能出现控制气体或粪便困难，这正是随访和盆底治疗的意义所在——如症状持续，有效治疗方法可供选择。请勿等待，尽早告知医疗团队任何漏气或漏便情况。

愈合与自我护理

- 1 保持粪便柔软** — 按处方服用大便软化剂，多饮水、多摄入膳食纤维，避免用力排便。
- 2 疼痛控制与卫生** — 按处方使用止痛药，如厕后用温水冲洗，保持会阴清洁干燥。
- 3 休息，循序渐进恢复** — 避免抱婴儿以外的重物搬运；预计数周内逐步好转。
- 4 盆底物理治疗** — 在初步愈合后有助于重建盆底力量。

随访与未来分娩

- 医生将检查伤口愈合情况和排便控制功能。
- 与医生讨论**未来分娩方式** — 医疗团队将建议下次分娩的最安全方案。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- **发热、疼痛加重或分泌物有异味**（可能感染）
- 伤口出现**裂开**迹象
- **漏气或漏便**，或新出现排便控制困难
- 严重便秘或无法排便

实用建议

- 坐位时可使用坐垫以减轻不适；早期用冰敷缓解肿胀。
- 未经医疗团队许可，请勿向直肠内放入任何物品（包括栓剂或灌肠剂）。

需要记住的三件事

- 1. 三度或四度撕裂（OASIS）累及肛门括约肌**，分娩后立即进行分层修复。
- 2. 保持粪便柔软、护理伤口、积极进行盆底治疗**——大多数患者可以恢复良好。
- 3. 如出现漏气、漏便、发热或伤口裂开**，请及时就医——早期干预效果更好。