

阴茎硬结症（佩罗尼病）

WARWIKI

患者须知 · 导致阴茎弯曲的瘢痕组织 — 及其治疗方法

阴茎硬结症（佩罗尼病）是一种病变，指阴茎壁内形成一块瘢痕组织（称为硬结），导致阴茎弯曲、变细、凹陷或缩短，勃起时有时伴有疼痛，可影响性生活。本病较为常见，不是癌症，且有有效的治疗方法——具体方案取决于病变所处阶段。

关于这种疾病

阴茎硬结症通常经历两个阶段：

- **活动期（急性期）** — 弯曲仍在变化，可能伴有疼痛，通常持续6至18个月。
- **稳定期** — 弯曲和硬结趋于固定，疼痛通常已缓解。

治疗方案取决于您目前处于哪个阶段，因此医疗团队会询问您病情随时间的变化情况。

病因

本病通常认为与性生活中阴茎受到轻微弯曲或损伤后愈合异常（形成异常瘢痕而非正常组织）有关。随年龄增长、合并糖尿病、前列腺手术后，以及同时患有**掌腱膜挛缩症**（一种类似的手部筋膜挛缩病变）的人群中，发病率更高。

名词解释

阴茎硬结症（佩罗尼病）

阴茎内瘢痕组织导致弯曲或畸形。

硬结（斑块）

引起弯曲的瘢痕组织块。

活动期与稳定期

指弯曲是否仍在变化或已趋于稳定。

牵引治疗

通过装置轻柔牵伸阴茎，以改善弯曲程度和长度。

胶原酶（Xiaflex）

注射至硬结内以分解瘢痕组织的药物。

折叠术 / 移植术

用于矫直阴茎弯曲的手术方式。

需要立即手术吗？ 通常不需要。在**活动期**，弯曲仍在变化，治疗重点是缓解不适和非手术干预。矫直手术一般在病情**稳定后**（弯曲固定且疼痛缓解）才考虑。许多患者无需手术即可好转。

如何诊断

- 详细询问弯曲情况、疼痛及其变化过程
- 体检触摸硬结；有时需拍摄勃起照片或在诊室进行专项评估
- 必要时行超声检查，以评估硬结位置及血流情况

如何治疗（按阶段）

- 1 活动期** — 给予安慰、疼痛控制，通常配合**牵引治疗**，目标是减缓病情进展。
- 2 硬结注射** — 将**胶原酶（Xiaflex）**等药物注射至硬结内，以减小弯曲角度。
- 3 手术（稳定期）** — **折叠术**（缝合较长侧；操作简便，可能缩短阴茎）或**硬结切开/移植术**（保留长度，适用于严重弯曲）。
- 4 阴茎假体** — 若同时合并勃起功能障碍，可考虑此方案。各选项均有独立的患者手册。

注意事项

- 不要试图强行“掰直”阴茎——这可能加重损伤。
- 若弯曲不影响性生活，可选择观察随访。
- 阴茎硬结症可影响情绪和亲密关系，心理支持有所帮助。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 弯曲**妨碍性生活**，或弯曲程度加重
- 勃起时出现**明显疼痛**
- 弯曲伴随**新发勃起功能障碍**

需要记住的三件事

- 1. 阴茎硬结症是导致阴茎弯曲的瘢痕组织——常见、非癌症、可治疗。**
- 2. 治疗取决于病变阶段：活动期以舒适护理和非手术治疗为主；稳定后再考虑矫直手术。**
- 3. 许多患者无需手术即可好转。若弯曲妨碍性生活、持续疼痛或出现新发勃起功能障碍，请及时就诊。**