

硬结切开并移植术

患者须知 · 矫正阴茎弯曲的手术（阴茎硬结症／佩罗尼病）

WARWIKI

阴茎硬结症（佩罗尼病）是阴茎内部形成瘢痕（硬结），导致勃起时阴茎弯曲，有时影响性生活。手术时，切开（有时部分切除）弯曲侧的瘢痕以松解弯曲，再用移植物填补缺口。本手册介绍手术原理、准备事项及术后注意事项。

关于这项手术

瘢痕组织将阴茎一侧拉紧，导致勃起时弯曲。手术通过切开较短（内侧）一侧的瘢痕来松解弯曲，产生的缺口用移植物填补——可为胶原补片、供体／动物组织或自体组织。因为延长了短侧而非缩短长侧，手术可保留阴茎长度。

适用情况：

- 弯曲**严重或形态复杂**（如沙漏形或铰链形）
- 保留**长度**很重要（折叠术会缩短过多）
- **勃起功能良好**，足以支持此手术

重要须知

优势在于**保留长度**（有时略有增加）。代价是比折叠术**更高的勃起功能障碍风险**——因为处理瘢痕可能影响阴茎充血功能——因此仅在勃起功能良好时方可采用。术后阴茎头**麻木感**常见（术中神经需轻轻移位），通常在6至12个月内恢复。多数患者可获得满意的直立勃起。

名词解释

阴茎硬结症（佩罗尼病）

阴茎内瘢痕导致勃起时弯曲的疾病。

硬结

造成弯曲的瘢痕组织块。

移植物

切开瘢痕后用于填补缺口的薄片——可为胶原补片、供体／动物组织或自体组织。

人工勃起

术中通过注射诱发的勃起，供医生测量和核查弯曲程度。

包皮环切

切除包皮——若未行包皮环切，通常同期完成。

阴茎康复

愈合期间使用勃起药物和／或真空装置，以保护勃起功能和阴茎长度。

全身麻醉

使您在手术期间保持无意识、无痛感的药物。

会疼吗？ 手术在全身麻醉或椎管内麻醉下进行，术中无感觉。术后1至2周内阴茎会有肿胀、淤青和酸痛——冰敷、支撑和止痛药有助缓解。此手术比折叠术耗时更长（通常1.5至3小时），可能需住院一晚。通常会留置导尿管，次日早晨取出。

如何准备（术前）

- 手术在**全身麻醉或椎管内麻醉**下进行——请遵守所有手术须知（禁食，以及需暂停哪些药物，包括抗凝药）。
- 阴茎硬结症应处于**稳定期**（弯曲和疼痛已稳定数月），术前会**评估勃起功能**——此手术要求勃起功能良好。
- **请勿吸烟**；任何感染须先治疗，并会预防性使用抗生素。若未行包皮环切，通常同期完成。

提前告知医疗团队以下情况：

- 有**勃起功能减退**，或需借助药物／注射实现勃起
- 正在服用抗凝药，或曾有阴茎手术史

手术过程

- 1 您在麻醉下处于睡眠或无痛状态；同时给予抗生素。
- 2 通过**注射诱发勃起**以显示弯曲；翻开皮肤，轻轻移开阴茎背侧神经。
- 3 切开（有时部分切除）短侧瘢痕以**松解弯曲**，用**移植植物**填补缺口；确认效果后缝合皮肤。

之后

- 术后1至2周内预计有**肿胀、淤青和酸痛**。阴茎头**麻木感**常见，通常数月内恢复。
- 导尿管通常于术后次日早晨取出。
- **约6至8周内避免性生活**，以便移植植物愈合。
- 医疗团队通常会启动**阴茎康复计划**——低剂量勃起药物和／或每日真空装置——以保护勃起功能和阴茎长度。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 发热或寒战，或伤口处红肿、疼痛、肿胀加重或有渗液
- 无法排尿
- 严重或加重的肿胀或疼痛，或大量出血

需要记住的三件事

1. 手术通过切开短侧瘢痕并用移植植物填补缺口来松解弯曲——可**保留阴茎长度**，适用于严重或复杂弯曲。
2. 代价是比折叠术更高的**勃起功能障碍风险**，因此仅在勃起功能良好时采用；术后阴茎头麻木常见，通常可恢复。
3. 手术前阴茎硬结症须稳定且勃起功能经过评估；请勿吸烟。术后约6至8周内避免性生活，坚持阴茎康复计划。出现发热、严重肿胀或排尿困难请及时就医。