

耻骨联合瘻（尿液侵蚀耻骨瘻）

WARWIKI

患者须知 · 尿液侵蚀耻骨，引起疼痛与感染

耻骨联合瘻（又称尿道耻骨联合瘻）是泌尿道（膀胱颈或尿道）与骨盆前方耻骨关节之间异常相通的通道——通常伴有该骨骼的感染。表现为严重的耻骨区或腹股沟疼痛及行走困难。本病少见但病情较重，但有明确的治疗方案。

关于这种疾病

尿液持续渗漏至耻骨，导致骨髓炎（骨感染）及关节破坏。典型症状包括：

- **严重的耻骨区、腹股沟或盆腔疼痛**，行走时加重
- 行走困难或无法负重
- 反复尿路感染，有时伴有漏尿

疼痛初期常被误诊为关节炎或骨科疾病，导致诊断延误。

病因

本病几乎均为**前列腺癌治疗**的晚期并发症——尤其是**放疗**后，常合并既往膀胱颈或尿道手术史。放疗后组织愈合能力差，使尿液得以侵蚀骨骼。

名词解释

耻骨联合

骨盆前方两块耻骨相连的关节。

耻骨联合瘻

泌尿道与该关节/骨骼之间的异常通道。

骨髓炎

骨骼感染。

MRI

显示骨骼及瘻管的最佳检查手段。

清创术

手术切除感染的骨骼和组织。

尿流改道

将尿液引离受损区域，通常是持久性的修复方式。

为何需要积极治疗？ 因为问题的核心是**感染且愈合能力差（通常经过放疗）的组织和骨骼**，单纯修补几乎无效。持久缓解通常需要切除感染骨骼并**将尿液引离该区域**——这正是常推荐尿流改道的原因。其优势在于，可以彻底终结多年的疼痛。

如何诊断

- 盆腔**MRI**（显示骨骼最佳）及尿道/膀胱内镜检查
- 培养以明确感染菌种
- 详细病史——包括既往前列腺癌治疗、放疗及手术经过

如何治疗

- 1 **抗生素**控制骨感染。
- 2 **手术切除感染骨骼**（清创术）并清洁创面。
- 3 **尿流改道**——许多患者最终需要**尿流改道**（有时还需切除受损的膀胱/尿道），因为放疗后的组织无法正常愈合。
- 4 **组织瓣**——可取健康肌肉或大网膜填充并促进缺损区域愈合。

治疗通常需要**多学科协作**（泌尿外科联合骨科和/或整形外科）。

注意事项

- 若前列腺放疗后出现原因不明的耻骨疼痛，请告知医生——本病容易被忽视。
- 尿流改道听起来令人担忧，但它往往是最终**缓解疼痛**和感染的有效方法。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- **发热、寒战或全身极度不适**（可能为感染扩散）
- 耻骨/腹股沟疼痛加重或**无法行走**
- 无法排尿或大量出血

需要记住的三件事

1. 耻骨联合瘻使尿液侵蚀耻骨，引起严重疼痛和骨感染——通常发生于前列腺放疗多年之后。
2. 本病常被误诊为关节炎；MRI可明确诊断。就诊时请告知医生既往放疗史。
3. 治疗需切除感染骨骼，通常还需尿流改道——虽然积极，但可以彻底终结疼痛。