

直肠尿道瘘（男性）

患者须知 · 直肠与尿道之间的异常通道

WARWIKI

直肠尿道瘘是直肠（肛门通道）与尿道（排尿管道）之间的一条异常小通道。它可使尿液流入直肠，也可使气体或粪便进入尿液，并反复引发感染。这种情况令人困扰，但可以修复—通常采用有计划的分期手术方式。

关于这种疾病

常见症状包括：**尿液中含有气体或粪便**（排尿时有气泡、尿液浑浊或有异味）、**尿液从直肠渗出**、反复尿路感染以及盆腔不适。这是一种"管道"问题，有对应的"管道"解决方案—与您的行为无关。

病因

大多数直肠尿道瘘是**前列腺癌治疗**的并发症—包括手术（前列腺切除术）、**放疗**或消融治疗（如冷冻治疗或高强度聚焦超声）—或继发于直肠手术。少数情况下由外伤、感染或炎症性肠病引起。**放疗**后出现的瘘愈合难度更大。

名词解释

瘘

连接两个器官的异常通道。

直肠尿道

直肠与尿道之间。

气尿

排尿时有气泡或气体。

粪尿

尿液中含有粪便成分。

尿流改道

临时改变尿液和（或）粪便的排出途径，以促进愈合。

结肠造口术

临时性粪便排出口，可在愈合后还纳。

股薄肌皮瓣

常用于加固修复的大腿肌肉组织瓣。

为什么我可能需要先做临时造口或导尿管？ 尿流改道（导尿管或引流管）和有时的粪便改道（临时结肠造口）可以减轻局部压力、控制感染并使炎症组织平复—从而为后续手术修复创造最佳愈合条件。这些改道措施通常是**临时性的**，愈合后可以还纳。

如何诊断

- 通过膀胱镜检查（**膀胱镜**）观察膀胱/尿道及直肠内部
- **造影检查**和影像学检查，确定瘘管的大小和位置
- 回顾病史（前列腺治疗史、放疗史）及组织质量评估

如何治疗

- 1 稳定与改道**—通过导尿管（有时加临时结肠造口）控制症状，使组织得以恢复。
- 2 手术修复**—通常经阴囊与肛门之间的会阴区域入路（经会阴），分层闭合异常通道。
- 3 组织瓣**—在修复处植入健康肌肉（常用**股薄肌**大腿瓣），尤其在放疗后更为重要。
- 4 还纳**—确认愈合后，临时造口可予还纳。

注意事项

- 时机很重要—医生通常会等炎症消退后再进行修复手术。
- 较小的非放疗性瘘有时仅靠留置导尿管即可自行愈合。
- 良好营养和戒烟有助于愈合。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- **发热、寒战或感觉明显不适**（可能为严重感染）
- **盆腔或直肠剧烈疼痛**
- **无法排尿或大量出血**

需要记住的三件事

1. 直肠尿道瘘连通直肠与尿道，导致尿液含有气体/粪便并反复感染，最常见于前列腺癌治疗后。
2. 治疗通常分期进行：先改道待组织稳定，再手术修复（尤其放疗后常需组织瓣加固），最后还纳临时造口。
3. 此病可以修复。出现发热、剧烈疼痛或无法排尿时，请立即就医。