

# 逆行尿道造影 (RUG)

患者须知 · 了解您的尿道 X 线检查

WARWIKI

**逆行尿道造影（简称 RUG）是一项简短的 X 线检查，用于拍摄尿道的影像。尿道是将尿液排出体外的管道。检查时，医生会将少量造影剂轻柔地注入尿道，使其在 X 线下清晰显影。这有助于您的医生在制定治疗方案前，发现并评估尿道内的狭窄、瘢痕或损伤。**

## 关于这项检查

尿道内的瘢痕组织或狭窄处——称为**尿道狭窄**——在普通影像检查中难以显现。RUG 通过向尿道注入特殊造影剂，使其在 X 线下呈白色，从而绘制出尿道内部的清晰“路线图”。

**医生可能在以下情况下开具 RUG 检查：**

- 发现尿道狭窄或瘢痕，并精确测量其位置和长度
- 评估尿道损伤情况
- 为尿道修复手术制定方案
- 评估尿道修复术后的愈合情况

该检查显示的是尿液通过的尿道管腔，不涉及肾脏，也不具有治疗作用，只是为后续治疗提供影像依据。

## 安全吗？

安全。RUG 是一项常见的低风险检查。X 线剂量很小，造影剂以水为基础，会随尿液排出体外。大多数人只有短暂、轻微的不适感。偶见副作用（如尿路感染、少量出血或短暂排尿困难）通常较轻微，很快即可缓解。

## 名词解释

### 尿道

将尿液从膀胱排出体外的管道。

### 尿道狭窄

尿道内的狭窄或瘢痕，可导致尿流减慢或受阻。

### 造影剂

一种液体，在 X 线下呈白色，使尿道内部得以清晰显影。

### 导尿管

一根细软管。检查时仅将顶端置于尿道口内，不会完全插入。

### 透视

一种实时动态 X 线技术，可在造影剂流动时显示连续影像。

### 尿道口

阴茎顶端排出尿液的开口。

### 尿培养

检查前对尿液样本进行的快速检测，用于排查感染。

### 重建泌尿外科医生

专注于泌尿系统及尿道修复的外科医生。

**会疼吗？** 大多数人在注入造影剂时只感到短暂的压迫感或轻微刺痛，不会有剧烈疼痛。如有不适，随时告知医护人员，他们可以放慢操作。整个检查约需 15–30 分钟。

## 如何准备（检查前）

检查前几乎不需要特别准备。通常情况下：

- **正常饮食**——除非医疗团队另有告知，无需禁食。
- 按常规服用**日常药物**，除非医疗团队要求暂停某种药物。
- 大多数患者无需镇静，检查后通常可以**自行驾车回家**。

**如有以下情况，请提前告知医疗团队：**

- 曾对 X 线造影剂或碘剂过敏
- 正在服用抗凝血药物
- 有尿路感染迹象（灼热感、发热或尿液浑浊、气味异常）——活动性感染可能需要推迟检查

您可能需要提供**尿液样本**以排查感染，并可能在检查前后服用**抗生素**以降低感染风险。

## 检查过程

- 1 您将躺在 X 线检查台上，通常略微侧卧。医护人员会协助您摆好体位。
- 2 清洁阴茎顶端后，将一根细软管放置于**尿道口内**——仅置入顶端。可能轻柔地充一个小气囊以固定导管。
- 3 缓慢注入造影剂，同时拍摄 X 线影像。检查期间请保持静止，正常呼吸。
- 4 医护人员在屏幕上观察造影剂流动并从不同角度拍片，随后取出导管。

## 检查后

- 通常可以**立即回家并恢复正常活动**。
- 排尿时可能有**轻微灼热感**，持续约一天。多喝水有助于冲洗并缓解不适。
- 尿道口可能有**少量出血**，或尿液略呈粉红色，这属正常现象，通常一天内消退。
- 造影剂会在数小时内随尿液排出体外。

### 出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 发热或畏寒
- 排尿困难或完全无法排尿
- 出血量多或持续不止
- 疼痛加重而非好转

## 需要记住的三件事

1. RUG 是一项快速、安全的 X 线检查，通过造影剂绘制尿道内部影像，帮助医生制定最佳治疗方案。
2. 检查前几乎无需特殊准备——正常饮食、按时服药即可，但请告知医疗团队任何造影剂过敏史、抗凝药物使用情况或尿路感染症状。
3. 大多数人只感到短暂压迫感，检查后即可回家。轻微灼热或少量出血持续约一天属正常——多喝水；如出现发热、大量出血或排尿困难，请及时联系医疗团队。