

睾酮替代治疗（男性）

WARWIKI

患者须知 · 适用于经确诊低睾酮且有症状的患者

睾酮替代治疗（TRT）适用于同时具备睾酮水平经检测确认偏低且有相关症状的男性——如性欲低下、疲乏、情绪低落、肌肉减少或勃起障碍。治疗通过凝胶、注射、贴片或皮下植入颗粒等方式将睾酮恢复至正常范围。TRT 不是"抗衰老"疗法，不适用于睾酮水平正常者。

作用原理与适用人群

低睾酮（性功能减退症）的诊断需要**两次晨间血液检测**结合症状综合判断——单次数值偏低不足以确诊。当两者均符合时，补充睾酮可在数周至数月内改善精力、性欲、情绪和肌肉状况。

给药方式

- **凝胶或溶液** — 每日外涂（须防止与女性及儿童皮肤接触）。
- **注射** — 每1-2周一次，或长效制剂约每10周一次。
- **贴片、皮下植入颗粒**（每3-6个月一次）或鼻用凝胶。

名词解释

睾酮

主要男性激素，影响性欲、精力、情绪和肌肉。

性功能减退症

经确认的低睾酮状态。

红细胞压积

TRT可能升高的血液指标，需定期监测。

PSA

前列腺特异性抗原，治疗前后均需检测。

生育能力

TRT会降低精子生成——如有生育计划须告知医生。

凝胶转移

凝胶蹭到他人皮肤的风险——涂药后遮盖并洗手。

有生育计划？ 请务必提前告知医生。TRT **会降低精子生成，可能导致不育** — 影响有时是持久性的。若您有生育意愿，有其他治疗方案可在提升睾酮的同时保护精子。开始TRT前请与医生充分沟通。

监测（重要）

TRT需要定期复诊和血液检查：

- **睾酮水平** — 确认在正常范围内。
- **红细胞压积** — TRT可使血液黏稠；若过高，需调整剂量或暂停用药。
- **PSA／前列腺** — 治疗前后均需检查；未经治疗的前列腺癌患者不可使用TRT。

安全使用须知

- **凝胶：**按医嘱涂抹，待干后遮盖，洗手，避免接触女性及儿童。
- 勿自行调整剂量；按时完成所有化验检查。
- 告知医生是否有心脏病或**睡眠呼吸暂停**（TRT可能使其加重）。

常见影响

- 痤疮、皮肤油腻、体液滞留
- 乳房触痛；睾丸缩小；生育能力下降
- 红细胞增多（可能需要监测或放血治疗）

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 胸痛、腿部肿胀／疼痛或呼吸困难
- 严重头痛、视力改变或“血液黏稠”症状
- 新出现的排尿问题或前列腺相关症状

需要记住的三件事

1. TRT仅适用于**经确诊低睾酮且有症状**的男性——不适用于正常水平或抗衰老目的。
2. TRT**会降低生育能力**——如有生育计划，开始前务必告知医生。
3. 需持续监测（睾酮、血常规、前列腺）。使用凝胶时，避免蹭到他人。