

尿道填充剂注射

WARWIKI

患者须知 · 用于压力性尿失禁的门诊注射操作

尿道填充剂注射是治疗压力性尿失禁（SUI）的微创方法——即咳嗽、大笑或活动时漏尿。将柔软的填充剂注入尿道周围，帮助尿道更好地闭合，从而减少腹压增加时的漏尿。操作快速、无需切口，可作为吊带手术前的替代方案或过渡选择。

作用原理

填充剂注射于尿道壁的多个位点，使尿道**局部膨隆**，关闭更为完全。尿道密封性改善后，腹压突然升高时尿液更不易外漏。

适合我吗？

- 适合希望选择**快速、低风险**的非手术治疗方法的患者
- 适合不适宜或不愿接受吊带手术的患者
- 可作为决定是否手术前的**过渡方案**

总体而言，其**持久性不如吊带**，可能无法完全治愈漏尿，但效果减退后可**重复注射**。

名词解释

压力性尿失禁

因腹压升高（咳嗽、大笑、提重物、运动）而漏尿。

填充剂

注射入尿道壁使其膨隆的柔软材料。

尿道

将尿液排出体外的管道。

膀胱镜

引导注射操作的细径摄像装置。

吊带

置于尿道下方的手术支撑物——效果更为持久的替代方案。

会疼吗？ 通常为**局部麻醉下的门诊操作**，约需10–15分钟。大多数患者仅感轻微压迫感，当天即可回家，可很快恢复正常活动。操作后短暂的烧灼感较为常见。

如何准备

- 操作前进行**尿液检测**以排除感染
- 告知医疗团队您正在服用的**抗凝药物**及过敏史
- 无需特殊准备——通常可自行驾车回家

操作过程

- 1 涂抹麻醉药物。
- 2 置入细径**膀胱镜**以观察尿道。
- 3 在尿道周围多个位点注射填充剂。
- 4 退出内镜；离开前需排空膀胱。

之后

- 操作后一两天内出现轻度烧灼感、尿急或少量血尿属正常现象。
- 操作后可能出现**短暂排尿困难**——通常很快缓解。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 操作后**无法排尿**
- 发热或寒战（可能提示感染）
- 大量出血或疼痛加重

注意事项

- 完整效果通常在数周内显现。
- 若漏尿随时间复发，可**重复注射**。
- 若希望获得更持久的效果，吊带手术仍是后续选项。

需要记住的三件事

1. 尿道填充剂注射是快速、无切口的门诊操作，通过使尿道膨隆来减少压力性漏尿。
2. 其持久性不如吊带，可能无法完全治愈漏尿，但风险低、可重复操作。
3. 恢复迅速。若操作后无法排尿或出现发热，请及时联系医疗团队。