

尿道成形术（尿道修复）

患者须知 · 修复尿道狭窄的手术

WARWIKI

尿道成形术是一种手术，用于修复尿道中狭窄、有瘢痕的部位 — 尿道是将尿液排出体外的管道。狭窄（即尿道狭窄）会减慢或阻断尿流；尿道成形术可将其重新打通，是最持久有效的修复方法。本手册介绍手术原理、准备事项及术后注意事项。

关于这项手术

尿道狭窄是尿道内有瘢痕、管径变窄的部位，导致膀胱难以排空。与单纯扩张或切开（容易复发）不同，尿道成形术可**重建**尿道至正常管径，是最可靠、最持久的治疗方式，成功率约为 **85–95%**。具体方式取决于狭窄的位置和长度：

- **切口**可位于**阴茎**、阴囊与肛门之间的区域（**会阴部**），或两处兼有 — 具体取决于狭窄位置。
- **较短**的狭窄可**切除后将健康两端缝合**。
- **较长**的狭窄则需要用**移植物扩宽** — 通常取自口腔内侧（详见专项手册）。

您的医生会告知哪种方式最适合您的情况。

安全吗？

尿道成形术是成熟、高效的手术，大多数患者术后可获得持久通畅的尿道。与所有手术一样，存在一定风险 — 出血、感染，或随时间推移狭窄复发（通常可再次治疗）。对勃起或射精的影响较少见，且多为暂时性。

名词解释

尿道

将尿液排出体外的管道。

尿道狭窄

尿道内有瘢痕、管径变窄的部位，减慢或阻断尿流。

尿道成形术

修复狭窄、将尿道重建至正常管径的手术。

移植物

取自自身组织（常取自口腔内侧颊黏膜）用于扩宽尿道的小片组织。

会阴部

阴囊与肛门之间的区域，常见切口位置之一。

导尿管

术后留置于尿道约 1–4 周，在修复愈合期间引流尿液的软管。

尿道造影

用于检查修复是否愈合的尿道 X 线检查，通常在拔管前进行。

全身麻醉

手术期间使您保持睡眠状态、无痛感的麻醉药物。

会疼吗？ 手术在全身麻醉或脊髓麻醉下进行，术中不会有任何感觉。术后切口周围（阴茎和/或会阴部）会有酸痛、肿胀和瘀青，持续数周 — 冰敷、阴囊托和止痛药可帮助缓解。醒来时导尿管已在位。手术时长因修复方式而异，通常为 2–4 小时。

如何准备（术前）

- 手术在**全身麻醉或脊髓麻醉**下进行 — 请遵守所有术前指示（禁食及需暂停服用的药物，包括抗凝药）。
- **尿液检查**排除感染 — 如有感染须先治疗。
- **请勿吸烟** — 吸烟会减慢愈合。若可能需要颊黏膜移植，请注意口腔卫生，必要时进行牙齿清洁。
- 做好术后**留置导尿管（约 1–4 周）**的准备，并安排人接送回家。

提前告知您的医疗团队，如果您：

- 正在服用**抗凝药**，或目前有尿路或皮肤感染
- 曾接受过尿道手术、放射治疗，或患有硬化性苔藓等皮肤病

手术过程

- 1 在麻醉下，您将处于睡眠状态或腰部以下无感觉；术前给予抗生素。
- 2 医生在狭窄部位（阴茎、会阴部或两者）做切口，打开有瘢痕的段落。
- 3 修复狭窄 — 切除后缝合两端，或用移植植物扩宽。
- 4 放置**导尿管**引流尿液并保护修复处愈合；缝合切口。

之后

- 您带着**导尿管**回家，通常留置约 **1–4 周**。医疗团队会指导您如何护理 — 请勿拉扯。
- 早期出现肿胀、瘀青及导尿管周围少量**血尿**属正常现象。
- 数周内（通常约 6 周）**避免重体力活动、用力、骑车及性生活**，以确保修复愈合。
- 拔管前通常需进行**尿道 X 线检查**，确认修复已愈合。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 导尿管**脱出、堵塞或停止引流**
- 发热或寒战，或切口处出现红肿加重、疼痛或渗液
- 大量出血，或拔管后**无法排尿**

需要记住的三件事

1. 尿道成形术重建狭窄的尿道，是最持久的修复方式。切口可位于阴茎、会阴部或两处，可能需要移植植物（常取自颊黏膜） — 医生会详细说明您的手术方案。
2. 术前准备：遵守禁食和用药指示，先治疗感染，戒烟，并做好术后留置导尿管（约 1–4 周）的安排。
3. 保留导尿管至医疗团队取出（通常在愈合 X 线检查之后），数周内避免重体力活动、用力 and 性生活。如导尿管停止引流、出现发热或拔管后无法排尿，请立即就医。