

尿路感染 (UTIs)

WARWIKI

患者须知 · 什么是尿路感染、如何治疗及如何预防

尿路感染（UTI）是细菌在尿路中繁殖引起的感染。大多数为膀胱感染，表现为排尿灼痛、尿急和尿频。少数情况下感染可蔓延至肾脏，病情更为严重。大多数尿路感染使用合适的抗生素后可快速痊愈，并有有效的方法预防复发。

关于这种疾病

膀胱感染（膀胱炎）通常表现为：

- 排尿时灼痛或刺痛
- 尿急和尿频 — 频繁如厕但每次尿量少
- 尿液混浊、颜色深或气味重；下腹部不适

肾脏感染（肾盂肾炎）更为严重，还会出现发热、寒战、腰背部或侧腹疼痛及恶心 — 需要及时就医。

病因

细菌（通常来自肠道）经尿道进入并在膀胱内繁殖。增加风险的因素包括性生活、绝经（雌激素降低）、膀胱排空不全、导尿管、结石和糖尿病。

名词解释

UTI

尿路任何部位发生的感染。

膀胱炎（Cystitis）

膀胱感染 — 最常见的尿路感染。

肾盂肾炎（Pyelonephritis）

肾脏感染 — 较严重，常伴发热。

尿液培养

通过培养细菌来选择合适抗生素的检测。

复发性尿路感染

反复发作的感染（通常一年2-3次或以上）。

阴道雌激素

低剂量乳膏/片剂，可降低绝经后尿路感染风险。

无症状菌尿

尿液中有细菌但无症状 — 通常无需治疗。

我必须使用抗生素吗？ 如有症状，尿路感染需使用抗生素治疗。但若尿液检测发现细菌而您**没有任何不适**，通常**无需**治疗 — 此时使用抗生素弊大于利。重要例外是妊娠期及某些泌尿系操作前。

如何诊断与治疗

- 医疗团队根据您的**症状及尿液检测/培养**结果确诊尿路感染。
- 膀胱感染采用**短疗程抗生素**治疗。
- **肾脏感染**可能需要更强或更长疗程的抗生素，有时需住院治疗。
- 即使症状好转，也应按疗程完成全部用药。

预防复发

- **多喝水**，避免长时间憋尿。
- 性生活后及时排尿；如厕后从前向后擦拭。
- 绝经后使用**阴道雌激素**可降低风险。
- 咨询非抗生素预防方案；仅在感染频繁时考虑预防性抗生素。

实用信息

- 蔓越莓产品和D-甘露糖对部分人有效；证据尚不一致 — 可以尝试。
- 反复尿路感染有时需检查是否存在潜在原因（如排空不全、结石）。
- 若留有导尿管，出现部分细菌属正常 — 是否治疗以症状为依据，而非仅凭检测结果。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- **发热、寒战或腰背部/侧腹疼痛**（可能为肾脏感染）
- 恶心、呕吐或感觉非常不适
- 肉眼可见**血尿**，或使用抗生素后症状无改善
- 妊娠期出现任何尿路感染症状

需要记住的三件事

1. 大多数尿路感染为膀胱感染（排尿灼痛、尿急），短疗程抗生素即可痊愈；肾脏感染（发热、侧腹痛）更为严重。
2. 尿液中有细菌但**无症状**通常无需治疗 — 妊娠期或某些操作前除外。
3. 多喝水、性生活后及时排尿、绝经后使用阴道雌激素有助于预防复发。如出现发热、侧腹痛或呕吐请及时就医。