

阴道雌激素治疗

WARWIKI

患者须知 · 针对阴道干涩和膀胱症状的低剂量局部治疗

阴道雌激素是一种低剂量、直接放置于阴道内的雌激素—剂型包括乳膏、片剂或阴道环—用于缓解绝经后雌激素下降引起的阴道干涩、刺激感、性交疼痛及泌尿系统症状。由于其局部作用，进入血液的量极少，大多数人使用均安全。

适应症

绝经后雌激素水平降低，会导致阴道和尿道黏膜萎缩变薄—这种情况称为**绝经泌尿生殖综合征（GSM）**。阴道雌激素可修复黏膜，并能：

- 缓解**阴道干涩、灼热和瘙痒及性交疼痛**
- 减轻尿急和尿频
- 降低**反复尿路感染**的风险

安全吗？

对大多数人来说，是安全的。阴道雌激素**剂量极低、局部作用**—与治疗潮热的口服或贴片雌激素有很大不同—吸收入体内的量极少。即使有乳腺癌或其他激素敏感性癌症病史，通常也可使用；请与您的医疗团队共同讨论决定。

名词解释

GSM

绝经泌尿生殖综合征—低雌激素引起的阴道干涩、萎缩及泌尿症状。

阴道雌激素

放置于阴道内的低剂量雌激素（乳膏、片剂或阴道环）。

局部 vs. 全身

局部作用于用药部位；全身用药（口服／贴片）影响全身。

维持剂量

最初几周后降低的持续用药剂量。

反复尿路感染

反复发作的膀胱感染，阴道雌激素有助于预防。

润肤剂／润滑剂

可与阴道雌激素联合使用的非激素类产品。

多久能见效？ 许多人在数周内即可感到改善，约8–12周达到最佳效果。只有持续用药才能维持疗效，因此需要长期使用—停药后症状往往会复发。

使用方法

- 1 **初始阶段：**大多数剂型需**每晚使用约2周**以修复黏膜。
- 2 **维持阶段：**之后改为**每周约两次**（阴道环每3个月更换一次）。
- 3 建议**睡前**使用，以确保药物留在原位；使用前后均需洗手。
- 4 长期坚持使用—持续使用是安全的，疗效依赖于规律用药。

可选剂型

- **乳膏**—借助涂药器给药，剂量灵活
- **片剂／阴道栓**—使用方便，剂量预先配好
- **阴道环**—每3个月放置一次，维护简便

注意事项

- 可同时使用非激素类**润肤剂或润滑剂**以增加舒适感。
- 用药初期出现少量分泌物或点滴出血较常见，通常会自行好转。
- 可与盆底肌锻炼及其他膀胱治疗方案联合使用。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 绝经后出现任何**阴道出血**—须及时就诊
- 新发乳房肿块或异常症状
- 刺激感加重而非好转

需要记住的三件事

1. 阴道雌激素是低剂量局部治疗，用于缓解绝经相关的阴道干涩、性交疼痛及泌尿症状—吸收入血液的量极少。
2. 最初每晚使用约2周，之后每周两次长期维持（或每3个月更换阴道环）；疗效依赖于持续用药。
3. 大多数人使用安全—如有癌症病史，请与医疗团队讨论。绝经后出血须及时报告。