

经阴道子宫切除术（用于脱垂）

WARWIKI

患者须知 · 经阴道切除子宫，同时行阴道顶端悬吊

当子宫因盆腔器官脱垂（pelvic organ prolapse）而下移时，一种治疗方式是经阴道子宫切除术——经阴道将子宫完整取出，无需腹部切口。手术几乎总是同时进行阴道顶端悬吊（有时还包括其他修补），以确保术后该区域获得良好支撑。

关于这项手术

子宫经阴道分离后取出。随后，**阴道顶端被悬吊**于您自身坚韧的盆腔韧带上，防止日后再次脱垂。根据查体结果，可同时进行阴道前壁或后壁修补。经阴道途径通常比经腹手术**疼痛更轻、恢复更快**。

注意事项

- 切除子宫后，月经停止，无法再妊娠。
- 若脱垂主要累及子宫，且您希望**保留子宫**，可选择保留子宫的悬吊术（子宫固定术）——请咨询您的医生。
- 如有需要，可同时进行**尿失禁**的治疗手术。

名词解释

子宫切除术

切除子宫的手术。

经阴道途径

经阴道操作，无需腹部切口。

阴道顶端悬吊

将阴道顶端重新固定，使其保持支撑。

子宫固定术

保留子宫的替代方案，通过悬吊而非切除。

脱垂

盆腔器官下移，引起膨出感或压迫感。

阴道填塞

术后短暂放置纱布，辅助愈合。

会疼吗？ 手术在麻醉下进行，过程中无痛感。由于无腹部切口，恢复通常比其他途径的子宫切除术更顺利——预计有轻至中度酸痛，多数患者当天或住院一晚后即可回家。

如何准备

- 遵照**麻醉须知**（禁食要求、按医嘱停用抗凝药物）。
- 完成术前评估；与医生讨论是否需要附加修补或抗尿失禁手术。
- 戒烟；安排好接送及术后居家照料。

过程

- 1 麻醉后给予抗生素。
- 2 子宫经**阴道**分离并取出。
- 3 阴道顶端**悬吊**于韧带上；按计划完成附加修补。
- 4 短暂留置导尿管，必要时放置阴道填塞。

之后

- 阴道顶端愈合期间，数周内少量出血或分泌物属正常现象。
- **约6周内避免重体力劳动、用力及性生活。**
- 保持大便松软，避免用力；充分休息后逐步增加活动量。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 发热或畏寒，或出血量多
- **无法排尿**，或盆腔/腹部疼痛加重
- 分泌物有异味，或阴道有异物脱出

需要记住的三件事

1. 经阴道子宫切除术经阴道取出子宫（无腹部切口），同时行阴道顶端悬吊。
2. 术后月经停止且不能妊娠；若希望保留子宫，请咨询保留子宫的悬吊方案。
3. 约6周内避免重体力劳动及性生活；少量出血属正常。如有发热、大量出血或排尿困难，请及时就诊。