

经阴道脱垂修复（补片/生物移植物）

患者须知 · 使用额外支撑材料加固脱垂修复

WARWIKI

部分经阴道脱垂修复手术会加入移植物—在自身组织薄弱处植入额外支撑材料。材料可以是生物移植物，在特定情况下也可使用补片。本页将客观说明各选项，包括经阴道补片的安全历史，帮助您与医生共同做出知情决策。

关于这项手术

医生经阴道切口修复薄弱的阴道壁，并植入移植物以增强支撑、降低脱垂复发风险。材料包括：

- **生物移植物**—来源于捐献的人或动物组织；随自身组织愈合逐渐被吸收。
- **合成补片**—永久性材料，**经过严格筛选**并充分告知后方可使用。

重要安全背景

经阴道植入**合成补片**用于脱垂修复曾受到**美国FDA警告**，因存在补片暴露和疼痛等风险，目前已在美国停止销售。目前，脱垂修复最常采用**自身（原生）组织**或生物移植物；经腹途径的补片（如骶骨阴道固定术）是另一种经充分验证的独立选择。您的医生会详细解释计划使用的材料及原因。

名词解释

脱垂

盆腔器官下垂，引起膨出感或压迫感。

移植物

修复手术中植入的额外支撑材料。

生物移植物

基于组织的材料，可被人体逐渐吸收。

合成补片

永久性材料；经阴道脱垂修复用途受限。

原生组织修复

仅使用自身组织修复，不植入移植物。

补片暴露

少量补片外露或可触及，可引起疼痛或分泌物。

我需要担心补片吗？ 这是一个合理的问题。引发警告的问题专指**经阴道合成补片用于脱垂修复**。原生组织修复、生物移植物和经腹补片具有不同且经充分研究的安全特性。关键在于了解您的医生具体计划及理由—请主动提问。

请向医生提问

- 您将使用**何种材料**—原生组织、生物移植物还是合成补片—为何适合我？
- 具体**风险**有哪些，包括补片暴露或性交疼痛？
- 我有哪些**替代方案**（原生组织修复、骶骨阴道固定术、子宫托）？
- 各方案脱垂复发的概率是多少？

如何准备

- 遵照**麻醉须知**（禁食、按医嘱停用抗凝药）。
- 戒烟；安排人接送并在家中提供帮助。
- 计划数周内轻度活动，避免盆腔劳累。

之后

- 术后数周内出现少量出血或分泌物属正常现象。
- **约6周内避免重体力劳动、用力排便及性生活。**
- 保持大便松软；逐步恢复正常活动。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 发热或寒战，或大量出血
- **无法排尿**，或疼痛加重
- 之后出现：**性交疼痛**、异常分泌物，或伴侣感觉有异物（可能是补片暴露）

需要记住的三件事

1. 移植物为阴道脱垂修复提供额外支撑—生物移植物可被吸收；合成补片是永久性材料，需严格筛选使用。
2. 经阴道补片用于脱垂修复曾受FDA警告；原生组织修复和生物移植物是常见选择，经腹补片是另一独立选项。
3. 请了解医生计划使用何种材料及原因。如事后出现性交疼痛或异常分泌物，请及时告知医生。