

Интракавернозные инъекции (пенильные инъекции при ED)

Информация для пациента · Самостоятельное введение препарата при эректильной дисфункции

WARWIKI

Интракавернозная инъекция (ICI) — метод лечения эректильной дисфункции (ED): небольшое количество препарата вводится в боковую поверхность полового члена тонкой иглой для достижения эрекции. Применяется, когда таблетки не действуют или противопоказаны. Игла очень маленькая, большинство мужчин почти не ощущают дискомфорта — это один из наиболее надёжных нехирургических методов лечения.

Об этом лечении

Препарат (чаще всего **alprostadil** или составные смеси — **bimix** и **trimix**) расслабляет сосуды эрекционных камер, что обеспечивает приток крови. Эрекция наступает **независимо от возбуждения**, обычно в течение **5–15 минут** и длится около 30–60 минут.

- **Первую дозу подбирают в клинике**, чтобы определить нужное количество и убедиться в безопасности.
- Затем вас научат **делать инъекции самостоятельно дома**.
- Метод часто эффективен, даже если таблетки не помогли, в том числе после операции на простате.

Это безопасно?

Для большинства мужчин — да, при тщательном подборе дозы. Главный риск — **затяжная эрекция (приапизм)** длительностью более 4 часов: это неотложное состояние. Возможны лёгкая болезненность, редкие синяки, а со временем — уплотнения (рубцы) в местах уколов; смена стороны введения снижает этот риск.

ТЕРМИНЫ

Эректильная дисфункция (ED)

Затруднение достижения или сохранения эрекции, достаточной для секса.

Интракавернозный

Внутри кавернозных тел (corpora cavernosa) полового члена.

Alprostadil

Наиболее распространённый препарат для инъекций при ED.

Trimix / bimix

Составные смеси из двух или трёх препаратов для инъекций.

Титрование

Подбор правильной дозы, как правило начинающийся в клинике.

Приапизм

Эрекция длительностью более 4 часов — неотложное состояние.

PDE5-ингибиторы

Таблетки для эрекции (например, силденафил); ICI применяется при их неэффективности.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Игла очень тонкая и вводится в боковую поверхность полового члена — большинство мужчин ощущают лишь лёгкий укол, а не боль. Небольшая ноющая боль после возможна, особенно при использовании alprostadil. Врач контролирует первое введение, чтобы убедиться в вашем комфорте и безопасности.

Как использовать безопасно

- 1 **Первая доза подбирается в клинике** — никогда не увеличивайте дозу самостоятельно.
- 2 Вводите в **боковую поверхность** (позиция 3 или 9 часов); **избегайте верхней и нижней поверхности и чередуйте стороны** при каждой инъекции.
- 3 После инъекции плотно прижмите место укола на несколько минут, чтобы уменьшить синяк.
- 4 Соблюдайте частоту, рекомендованную врачом — как правило, не чаще одного раза в 24 часа и около 3 раз в неделю.

Как подготовиться

- Храните препарат согласно инструкции (некоторые смеси требуют холодильника).
- Сообщите врачу о приёме **антикоагулянтов** и любых сердечных заболеваниях.
- Если вам комфортнее, возьмите партнёра на обучение.

Обратитесь за экстренной помощью, если:

- Эрекция длится **более 4 часов** (приапизм) — обратитесь в скорую помощь; промедление может привести к необратимым повреждениям
- Сильная боль, обильное кровотечение или признаки инфекции в месте укола
- Головокружение или боль в груди после введения дозы

Полезно знать

- Всегда имейте при себе информацию о дозе и частоте введения, выданную врачом.
- Сообщайте о новых уплотнениях или искривлении полового члена.

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. ICI — тонкая игла, препарат вводится в боковую поверхность полового члена; эрекция наступает через 5–15 минут и надёжна даже при неэффективности таблеток.
2. Первую дозу подбирает врач; не повышайте дозу самостоятельно, чередуйте стороны и не превышайте установленную частоту.
3. Эрекция **длительностью более 4 часов — неотложное состояние:** немедленно вызовите скорую помощь.