

Мужской уретральный слинг

Информация для пациента · Слинг для лечения недержания мочи после операции на простате

WARWIKI

Мужской слинг — мягкая полоска сетки, укладываемая под уретру (трубку, по которой выходит моча), для лечения стрессового недержания мочи (SUI) — чаще всего подтекания мочи при кашле, подъёме тяжестей или физической нагрузке после операции на простате. Слинг приподнимает и поддерживает уретру, улучшая удержание мочи. В отличие от искусственного сфинктера (AUS), никаких механизмов управления нет. Этот материал объясняет, как действует слинг, как подготовиться и чего ожидать.

Об этой операции

Подтекание мочи при нагрузке, кашле или подъёме тяжестей называется **стрессовым недержанием мочи (SUI)** и нередко возникает после операции на простате. Слинг устраняет его, укладывая под уретру мягкую сетчатую полоску, которая мягко возвращает уретру в нормальное положение.

Слинг **поддерживает** уретру, а не пережимает её, поэтому после заживления вы **мочитесь нормально** — никаких кнопок, насосов или устройств управления нет.

Что важно знать

Слинг наиболее эффективен при **лёгком и умеренном** недержании у мужчин с сохранённой функцией сфинктера, что хирург проверяет заранее. При выраженном недержании или после **лучевой терапии на малый таз** предпочтительнее **искусственный уретральный сфинктер (AUS)** — врач поможет выбрать оптимальный вариант. Слинг может значительно **уменьшить** подтекание, но не всегда устраняет его полностью; при недостаточном эффекте AUS можно установить позднее.

ТЕРМИНЫ

Стрессовое недержание мочи (SUI)

Подтекание мочи при нагрузке, кашле или подъёме тяжестей.

Уретра

Трубка, по которой моча выводится из организма.

Слинг

Мягкая сетчатая полоска, укладываемая под уретру для её поддержки.

Проверка репозиции

Осмотр уретры изнутри с помощью камеры для подтверждения эффективности слинга.

Задержка мочи

Временные затруднения с опорожнением мочевого пузыря после операции; может потребоваться катетер на короткое время.

Искусственный сфинктер (AUS)

Альтернативное устройство с насосом; обычно применяется при выраженном недержании.

Общая анестезия

Препараты, обеспечивающие сон и отсутствие боли во время операции.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Операция проводится под общей или спинальной анестезией, поэтому во время неё вы ничего не чувствуете. Она длится около часа, и многие пациенты выписываются в тот же день.

Как подготовиться (до операции)

- Операция проводится под **общей или спинальной анестезией** — соблюдайте все предоперационные указания (голодание, отмена лекарств, включая антикоагулянты).
- Анализ мочи** исключает инфекцию (при необходимости она лечится заранее); **цистоскопия** подтверждает, что слинг подойдёт.
- Не курите**, контролируйте вес и сахарный диабет, принимайте назначенные антибиотики — слинг является имплантатом из сетки.

Заранее сообщите врачу, если у вас:

- Была **лучевая терапия на малый таз** — эффективность слинга снижается, AUS может быть лучше
- Ранее проводились операции по поводу недержания или сужение уретры
- Есть какая-либо инфекция

Что происходит во время операции

- 1 Вы находитесь под анестезией (сон или онемение ниже пояса); вводятся антибиотики.
- 2 Через небольшие разрезы в паху и промежности хирург проводит сетчатый слинг под уретрой и приподнимает её в нужное положение.
- 3 Слинг фиксируется, разрезы ушиваются; как правило, ненадолго устанавливается катетер.

После операции

- Ожидайте **болезненности, отёка и синяков** в паху и промежности в течение 1–2 недель. Используйте лёд, поддерживающее бельё и обезболивающие.
- Избегайте тяжестей, натуживания, велосипеда и половых контактов** ~6 недель — нагрузка может сместить слинг до заживления.
- Возможны **временные затруднения при мочеиспускании**; может ненадолго потребоваться катетер.
- Поначалу пользуйтесь прокладками — улучшение нарастает постепенно. **Устройств управления нет**; после заживления вы мочитесь нормально.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Полностью отсутствует мочеиспускание**
- Повышение температуры, озноб или нарастающая краснота, боль, выделения из разреза
- Усиливающаяся боль в паху или промежности

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Мужской слинг — сетчатая полоска под уретрой, поддерживающая её и улучшающая удержание мочи после операции на простате; устройств управления нет.
2. Наилучший результат — при **лёгком и умеренном** недержании; при выраженном или после лучевой терапии предпочтительнее AUS (его можно установить позднее).
3. После операции **избегайте тяжёлых нагрузок, натуживания, велосипеда и секса** несколько недель; возможны временные затруднения с мочеиспусканием.