

Пластический протез полового члена

WARWIKI

Информация для пациента · Гибкий (полужёсткий) протез при эректильной дисфункции

Пластический протез полового члена — иначе называемый полужёстким — представляет собой пару гибких стержней, имплантируемых в половой член мужчинам с эректильной дисфункцией (ED), которая не поддаётся лечению таблетками, инъекциями или иными методами. Никакой помпы нет: вы просто сгибаете член вверх для полового акта и вниз — для скрытия под одеждой. В этом листке объясняется, как работает протез, как подготовиться и чего ожидать.

Об этой операции

Когда **эректильная дисфункция (ED)** не устраняется таблетками, вакуумным устройством или инъекциями, имплантат является наиболее надёжным следующим шагом. Пластический протез — простейший вариант: два гибких стержня с мягким покрытием вводятся в половой член. Он всегда остаётся достаточно твёрдым для полового акта, и вы позиционируете его рукой:

- Согните **вверх** для полового акта
- Согните **вниз**, чтобы скрыть под одеждой

Поскольку нет помпы, резервуара и жидкости, это **простейший в использовании и наиболее долговечный** тип протеза — хороший выбор, если работать с помпой затруднительно (например, при слабой силе кистей).

Что важно знать

Как и все протезы полового члена, этот — **необратимый выбор**: имплантация изменяет эректильную ткань, поэтому впоследствии естественные эрекции и другие методы лечения ED (таблетки, инъекции) не работают. Протез **не влияет на мочеиспускание, чувствительность, оргазм или эякуляцию**. Главный компромисс по сравнению с надувным типом: член остаётся твёрдым постоянно, поэтому его немного сложнее скрыть и ощущение менее естественное — однако это более простой и долговечный вариант.

ТЕРМИНЫ

Эректильная дисфункция (ED)

Затруднение достижения или поддержания эрекции, достаточной для полового акта.

Протез полового члена

Устройство, имплантируемое в половой член для обеспечения эрекции, когда другие методы не помогли.

Пластический / полужёсткий

Гибкий протез, сохраняющий твёрдость члена; позиционируется рукой, без помпы.

Надувной протез

Другой основной тип — помпа надувает и сдувает его; более естественный, но с большим числом компонентов.

Скрытие

Сгибание члена вниз, чтобы протез не был замечен под одеждой.

Общая анестезия

Препараты, погружающие вас в сон и устраняющие боль во время операции.

Долговечный

Длительно служащий — без жидкостных компонентов практически нечему изнашиваться или ломаться.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Операция проводится под общей или спинномозговой анестезией, поэтому вы ничего не чувствуете. После неё ожидайте болезненности, отёка и кровоподтёков полового члена и мошонки в течение 1–2 недель — помогают суспензорий, лёд и обезболивающие. Операция короткая (обычно менее часа) и, как правило, проводится в день хирургии. Не используйте протез для секса до разрешения хирурга.

Как подготовиться (до операции)

- Операция выполняется под **общей или спинномозговой анестезией** — соблюдайте все предоперационные указания (голодание, отмена препаратов, включая антикоагулянты).
- **Профилактика инфекции крайне важна для имплантата:** любая инфекция (в том числе мочевых путей) должна быть пролечена заранее; вам назначат антисептическое мытьё и антибиотики.
- **Не курите и не используйте вейп;** при **сахарном диабете** команда потребует хорошего контроля сахара крови — это снижает риск инфекции.

Заранее сообщите команде, если у вас:

- **Сахарный диабет** или иное состояние, нарушающее заживление ран
- Ранее перенесённые операции на органах малого таза или половом члене, лучевая терапия или предшествующий имплантат

Что происходит во время операции

- 1 Вы спите или обезболены от пояса вниз под анестезией; вводятся антибиотики.
- 2 Через один небольшой разрез хирург помещает **гибкий стержень в каждое из двух тел** полового члена. Помпы и резервуара нет.
- 3 Разрез ушивается, член оставляется в согнутом положении вниз. Катетер может быть установлен на короткое время.

После операции

- Ожидайте **отёка и кровоподтёков** полового члена и мошонки 1–2 недели. Носите суспензорий, прикладывайте лёд, держите рану чистой и сухой.
- **Не используйте протез для секса до разрешения хирурга** — обычно около **4–6 недель**, после полного заживления.
- После заживления **помпа не нужна:** просто сгибайте член вверх для использования и вниз для скрытия. Команда покажет, как это делать.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Повышение температуры или озноб, нарастающее покраснение, боль, отёк или выделения из раны
- Невозможность помочиться
- Сильная или усиливающаяся боль, или потемнение (синюшность) полового члена

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Пластический протез — два гибких стержня в половом члене: сгибайте вверх для секса, вниз для скрытия. Без помпы — простейший и наиболее долговечный тип.
2. Это **необратимый выбор** (естественные эрекции и таблетки/инъекции после не работают), но он **не влияет на мочеиспускание, чувствительность, оргазм и эякуляцию**.
3. Профилактика инфекции — главное: пролечите инфекции, не курите, контролируйте диабет, используйте антисептик и антибиотики (протезом не пользуйтесь до разрешения хирурга, ~4–6 недель).