

Скелетно-мышечная боль в тазу

WARWIKI

Информация для пациента · Боль из мышц, суставов и нервов таза

Часть тазовых болей возникает не из мочевого пузыря или репродуктивных органов, а из **мышц, суставов, нервов и соединительной ткани** таза — нередко это перенапряжённое тазовое дно, которое не может расслабиться. Это реальное, распространённое и поддающееся лечению состояние, даже если результаты анализов и снимков в норме.

Об этом состоянии

Мышцы тазового дна могут перенапрячься или войти в спазм — как «узел» в любой другой мышце. Типичные проявления:

- Ноющая боль, давление или жжение в тазу, промежности, пояснице или бёдрах
- Боль при **длительном сидении**, половых контактах (диспареуния), использовании тампонов или при дефекации
- **Учащённые позывы к мочеиспусканию**, вызванные напряжёнными мышцами, а не самим мочевым пузырём

Причины

Обычно действует сочетание факторов: мышечное напряжение или спазм, травма, операция или роды в прошлом, нарушения осанки и привычки, стресс (заставляющий нас сжиматься) и иногда — раздражение тазового нерва. Нередко это «короткое и тугое» тазовое дно, а не слабое, — поэтому интенсивные упражнения Кегеля могут усугубить состояние.

ТЕРМИНЫ

Тазовое дно

Комплекс мышц, поддерживающих органы таза.

Гиперактивное / тугое тазовое дно

Мышцы, постоянно напряжённые и неспособные полностью расслабиться.

Диспареуния

Боль при половом контакте.

Триггерная точка

Болезненный мышечный «узел», способный давать боль в отдалённые зоны.

Тазовая физиотерапия (РТ)

Лечебная физкультура, расслабляющая и переобучающая эти мышцы.

«Down-training»

Обучение расслаблению (а не укреплению) тугого тазового дна.

Срамной нерв

Нерв таза, раздражение которого может вызывать боль.

ПОЧЕМУ АНАЛИЗЫ В НОРМЕ, А БОЛЬ ЕСТЬ? Потому что эта боль исходит из мышц и нервов, а не из инфекции или образования, видимого на снимке. Нормальный результат — хорошая новость: он указывает на поддающуюся лечению мышечную проблему, а не на что-то опасное. Боль, не «видимая» на снимке, всё равно реальна.

Как это диагностируют

- Сбор анамнеза: где, когда и что усиливает боль
- Осмотр с **оценкой мышц тазового дна** на болезненность и тугость
- Исключение других причин (инфекция и др.) с помощью простых тестов

Как это лечат (поэтапно)

- 1 **Физиотерапия тазового дна** — основа лечения: мануальное расслабление, растяжка и «down-training».
- 2 **Самопомощь** — тепло, мягкое движение, расслабляющее дыхание, коррекция осанки, нормализация стула и устранение раздражителей мочевого пузыря.
- 3 **Препараты или инъекции** — средства от нейропатической боли или инъекции в триггерные точки.
- 4 **Работа со стрессом и сном**, которые сильно влияют на мышечное напряжение.

Жизнь с этим состоянием

- Замечайте и снимайте **напряжение** (челюсть, ягодицы, тазовое дно) в течение дня.
- Используйте тепло и мягкую растяжку; избегайте долгого сидения на твёрдом.
- Улучшение обычно наступает постепенно в ходе нескольких недель терапии — важна регулярность.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Новая **острая** тазовая боль или повышение температуры
- Новые изменения функции кишечника или мочевого пузыря, онемение или слабость в ногах
- Боль после падения или травмы, кровь в моче или стуле

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Тазовая боль нередко исходит из напряжённых мышц и нервов — она реальна и поддаётся лечению, даже когда анализы в норме.
2. Физиотерапия тазового дна (на расслабление, а не укрепление) — основа лечения; дополняют её самопомощь, препараты и коррекция стресса.
3. Улучшение постепенное. Обратитесь за помощью при новой острой боли, температуре, онемении или слабости в ногах, изменениях мочеиспускания или стула.