

Ночное мочеиспускание

Информация для пациента · Пробуждение ночью для мочеиспускания — причины и методы лечения

WARWIKI

Ночное мочеиспускание (nocturia) — это пробуждение из сна один или более раз для мочеиспускания. Оно очень распространено, особенно с возрастом, но с этим не нужно просто мириться: оно нарушает сон, вызывает дневную усталость и повышает риск ночных падений. Большинство причин поддаётся лечению, если их выявить.

Об этом состоянии

Есть три основные причины ночного пробуждения для мочеиспускания, и у многих пациентов их **сочетание**:

- **Избыточное образование мочи ночью** (ночная полиурия) — от вечерних жидкостей, кофеина или алкоголя, отёков ног, заболеваний сердца или почек, апноэ сна или мочегонных препаратов.
- **Уменьшение ёмкости мочевого пузыря** — из-за гиперактивного мочевого пузыря (OAB) или увеличенной простаты.
- **Нарушение сна** — вы просыпаетесь по другой причине и затем решаете помочиться.

Почему это важно

Помимо плохого сна, ночные подъёмы — одна из главных причин **падений и переломов** у пожилых. Поскольку ночное мочеиспускание нередко указывает на поддающуюся лечению проблему (а порой — на апноэ сна или заболевание сердца), оно заслуживает обследования, а не игнорирования.

ТЕРМИНЫ

Nocturia

Пробуждение из сна для мочеиспускания.

Ночная полиурия

Образование значительной доли суточной мочи в ночное время.

Дневник мочеиспускания

Запись времени и объёма мочеиспусканий днём и ночью.

Гиперактивный мочевой пузырь

Мочевой пузырь, подающий сильные позывы и имеющий меньшую ёмкость.

Апноэ сна

Нарушение дыхания во сне, способное увеличивать ночной диурез.

Desmopressin

Препарат, уменьшающий ночную выработку мочи у отдельных пациентов.

ПЕРВЫЙ ШАГ: ДНЕВНИК МОЧЕИСПУСКАНИЯ Ведение **дневника мочеиспускания** в течение нескольких дней — записывать, когда и сколько вы пьёте и мочитесь, — наиболее полезное, что вы можете сделать. Он покажет вашему врачу **причину** ночного мочеиспускания и определит лечение.

Как это диагностируют

- **Дневник мочеиспускания** и анализ потребляемых жидкостей, принимаемых лекарств и качества сна
- **Анализ мочи**, оценка на увеличение простаты или ОАВ
- Обследование на **отёки ног, апноэ сна** или сердечно-почечные причины при необходимости

Как это лечат

- 1 **Вечерний режим** — ограничьте жидкость, кофеин и алкоголь за 3–4 часа до сна.
- 2 **При отёках ног** — поднимайте ноги в послеобеденное время, носите компрессионные чулки; принимайте мочегонные препараты раньше (по назначению врача).
- 3 **Лечение причины со стороны мочевого пузыря** — ОАВ или увеличенная простата.
- 4 **Целевые препараты или лечение сна** — например, desmopressin при истинной ночной полиурии или лечение апноэ сна.

Безопасность ночью

- Используйте **ночник** и поддерживайте свободный путь до туалета, чтобы не упасть.
- Вставайте медленно, особенно если принимаете препараты от давления.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- **Кровь в моче**, жжение или повышение температуры (возможная инфекция)
- При приёме desmopressin: **тошнота, головная боль или спутанность сознания** (возможно снижение натрия)
- **Отёки**, одышка или значительное изменение суточного диуреза

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Ночное мочеиспускание распространено, нарушает сон и повышает риск падений; оно, как правило, имеет поддающуюся лечению причину.
2. Дневник мочеиспускания в течение нескольких дней — ключевой первый шаг для выявления причины и выбора лечения.
3. Ограничьте вечернюю жидкость, устранили отёки ног, лечите причину со стороны пузыря или сна. Предотвращайте ночные падения с помощью ночника и свободного пути.