

Optilume — это малоинвазивный метод лечения сужения уретры (стриктуры) — трубки, по которой моча выходит из тела. Специальный баллон аккуратно расширяет суженный участок и одновременно вводит в его стенку лекарство, препятствующее повторному рубцеванию. Разрезов и внешних швов нет.

Об этой процедуре

Стриктура (сужение) уретры — это рубцово-суженный участок, замедляющий мочеиспускание. Простое растяжение или рассечение часто не предотвращает повторного сужения. Optilume действует сразу двумя способами:

- **Баллон расширяет** рубцово-суженный участок.
- **Лекарственное покрытие (paclitaxel)** на баллоне доставляется в ткань, замедляя повторное рубцеобразование.

Метод подходит для отдельных **рецидивных стриктур** бульбарной части уретры (под мошонкой) длиной **менее ~3 см**, возникших после предшествующего расширения или рассечения. Он надёжнее обычной дилатации, однако **не заменяет уретропластику** (открытую пластику) — наиболее долговечный вариант. Врач объяснит, насколько этот метод подходит именно вам.

Это безопасно?

Optilume малоинвазивен, выполняется через уретру, как правило амбулаторно, и обычно хорошо переносится. Доза лекарства невелика и остаётся в месте введения. Возможные риски: кровь в моче или сперме, кратковременное жжение, инфекция мочевыводящих путей (UTI), а также повторное сужение со временем.

ТЕРМИНЫ

Уретра

Трубка, по которой моча выходит из тела.

Стриктура

Рубцово-суженный участок уретры, замедляющий мочеиспускание.

Бульбарная уретра

Часть уретры под мошонкой — наиболее подходящая зона для этого лечения.

Баллон с лекарственным покрытием

Баллон, расширяющий сужение и доставляющий лекарство в стенку уретры.

Paclitaxel

Лекарство на баллоне, препятствующее повторному рубцеванию.

Дилатация

Расширение сужения — здесь выполняется баллоном.

Цистоскоп

Тонкая оптическая трубка для осмотра и контроля сужения.

Катетер

Мягкая трубка, устанавливаемая в уретру на короткое время после процедуры.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Процедура проводится под анестезией или седацией — во время неё вы ничего не почувствуете. После возможны лёгкое жжение, тупая боль в области таза или полового члена, небольшая примесь крови в моче или сперме — на несколько дней. Обычно устанавливается катетер на короткое время. Процедура занимает мало времени, выписка чаще всего в день операции.

Как подготовиться (до процедуры)

- Соблюдайте **инструкции по анестезии или седации** (голодание, отмена лекарств, в том числе антикоагулянтов).
- **Анализ мочи** выявит инфекцию — при её наличии сначала проводится лечение.
- **Организируйте транспорт домой** и учтите, что на короткое время будет установлен катетер.

Сообщите врачу заранее, если вы:

- Принимаете **антикоагулянты** или имеете активную инфекцию мочевыводящих путей
- **Планируете зачатие** — из-за лекарства вас попросят использовать презерватив и воздержаться от попыток зачатия в течение срока, указанного врачом

Что происходит во время процедуры

- 1 Вас вводят в сон или состояние седации; цистоскоп уточняет длину и расположение сужения.
- 2 Через сужение проводится тонкий проводник, участок предварительно расширяется до нужного размера.
- 3 Баллон с лекарственным покрытием устанавливается по центру рубца и раздувается на заданное время, доставляя лекарство.
- 4 Баллон и цистоскоп извлекаются; на короткое время устанавливается катетер.

После процедуры

- Катетер удаляется через **короткое время**; врач скажет когда.
- Несколько дней возможны **лёгкое жжение и розоватая моча или сперма**. Пейте больше воды.
- **Избегайте нагрузок** в течение нескольких дней; пройдите контрольный осмотр (оценка струи или симптомов).
- **Используйте презерватив** столько, сколько рекомендует врач, из-за лекарства.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Повышение температуры или озноб
- Вы **не можете помочиться**, особенно после удаления катетера
- Обильное кровотечение или сгустки крови в моче
- Боль усиливается, а не уменьшается

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Optilume расширяет сужение уретры баллоном и вводит лекарство, предотвращая повторное рубцевание — это эндоскопический метод, не замена открытой уретропластике.
2. Подготовка: голодание и отмена лекарств по инструкции, предварительное лечение инфекции, организация транспорта; сообщите врачу о планах на зачатие.
3. Лёгкое жжение и небольшая примесь крови в моче или сперме в течение нескольких дней — норма. Используйте презерватив указанный срок; обращайтесь при температуре, обильном кровотечении или задержке мочи.