

Гиперактивный мочевой пузырь (ОАВ)

Информация для пациента · Внезапные позывы, учащённое мочеиспускание и недержание

WARWIKI

Гиперактивный мочевой пузырь (ОАВ) — распространённое и поддающееся лечению состояние, при котором мышца мочевого пузыря сокращается в неподходящий момент. Это вызывает **внезапные сильные позывы к мочеиспусканию**, учащённые походы в туалет, пробуждения ночью и иногда потерю мочи по дороге. ОАВ — не норма старения, и существует много способов улучшить состояние.

Об этом состоянии

В норме мочевой пузырь наполняется спокойно и подаёт сигнал, когда заполнен. При ОАВ он посылает «срочный» сигнал слишком рано или слишком сильно. Основные симптомы:

- **Ургентность** — внезапный, трудно сдерживаемый позыв к мочеиспусканию
- **Учащённость** — мочеиспускание более ~8 раз в сутки
- **Ноктурия** — пробуждения ночью для мочеиспускания
- **Ургентное недержание** — потеря мочи по дороге в туалет

Причины

Единой причины часто нет — проблема в нарушении сигналов между мочевым пузырём и мозгом. Провоцировать или усилить ОАВ могут **кофеин и алкоголь**, запоры, избыточный вес, некоторые лекарства и (у женщин) менопауза. Те же симптомы даёт инфекция мочевыводящих путей — её исключают в первую очередь. Иногда причиной служит неврологическое нарушение.

ТЕРМИНЫ

Гиперактивный мочевой пузырь (ОАВ)

Ургентность и учащённое мочеиспускание из-за преждевременных сокращений пузыря.

Ургентность

Внезапный сильный позыв к мочеиспусканию, который трудно сдержать.

Учащённость

Необходимость мочиться много раз в течение дня.

Ноктурия

Пробуждение ночью для мочеиспускания.

Ургентное недержание

Непроизвольная потеря мочи при сильном позыве.

Дневник мочеиспускания

Простой журнал, куда записывают выпитое, походы в туалет и эпизоды потери мочи.

Тазовое дно

Мышцы, тренировка которых помогает контролировать мочевой пузырь.

Тренировка мочевого пузыря

Постепенное увеличение интервалов между мочеиспусканиями для снижения ургентности.

СТАНЕТ ЛИ ЛУЧШЕ? Да — у большинства пациентов наступает улучшение. Лечение начинают с простых изменений и тренировки мочевого пузыря, переходя к следующим шагам только при необходимости. Заметный эффект может появиться через несколько недель — давайте каждому шагу время и сотрудничайте с врачом.

Как это диагностируют

- Беседа о симптомах и **дневник мочеиспускания**
- **Анализ мочи** для исключения инфекции и крови
- Оценка полноты опорожнения (УЗИ-сканирование пузыря)
- При необходимости — дополнительные исследования (уродинамика или цистоскопия), если картина неясна или предыдущее лечение не помогло

Как это лечат (поэтапно)

- 1 Изменение образа жизни и тренировка** — ограничьте кофеин и алкоголь, нормализуйте потребление жидкости, устраните запоры, снизьте избыточный вес, выполняйте **тренировку мочевого пузыря и упражнения для тазового дна (Кегеля)**.
- 2 Лекарства** — препараты, снижающие активность мышцы мочевого пузыря.
- 3 Расширенные методы** — введение **Botox** в мочевой пузырь или **нейростимуляция** (PTNS или сакральная нейромодуляция). По каждому методу есть отдельный листок.

Жизнь с ОАВ

- Ведите **дневник мочеиспускания** несколько дней, чтобы выявить провоцирующие факторы.
- Пейте жидкость равномерно; не ограничивайте её настолько, чтобы моча становилась концентрированной.
- Используйте **мочеиспускание по расписанию** и приёмы «контроля позыва» (остановитесь, сожмите мышцы тазового дна, дышите, затем идите), которым вас обучит врач.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- **Кровь в моче** или боль и жжение при мочеиспускании
- Повышение температуры или боль в спине/боку (возможная инфекция)
- Внезапная **невозможность помочиться**

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

- 1.** ОАВ — ургентность, учащённость, ноктурия и иногда недержание — распространённое и поддающееся лечению состояние, а не норма старения.
- 2.** Лечение ступенчатое: сначала образ жизни и тренировка пузыря, затем лекарства, затем Botox или нейростимуляция.
- 3.** Дневник мочеиспускания помогает найти триггеры; давайте каждому шагу несколько недель. Обратитесь к врачу при крови в моче, боли, температуре или невозможности помочиться.